



Universitat
de les Illes Balears

TREBALL DE FI DE GRAU

**ROL DE LAS ENFERMERAS EN LA DETECCION DE
VIOLENCIA DE GÉNERO: UNA REVISIÓN DE LA
LITERATURA**

María del Carmen Suárez Rodríguez

Grau de: Enfermería

Facultat de: Enfermería y fisioterapia

Any acadèmic 2022-23

ROL DE LAS ENFERMERAS EN LA DETECCION DE VIOLENCIA DE GÉNERO: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

María del Carmen Suárez Rodríguez

Treball de Fi de Grau

Facultat de: Enfermería

Universitat de les Illes Balears

Any acadèmic 2022-23

Paraules clau del treball:

Violencia de género, funciones de enfermería, detección de violencia contra la mujer, abordaje de violencia, violencia de pareja intima

Nom del tutor / la tutora del treball: Rosa Miró Bonet

Agradecimientos

"La gratitud es la memoria del corazón". (Lao Tse)

Este trabajo es un logro en el cual directa o indirectamente han participado varias personas, a las cuales quiero agradecer por haber contribuido a su realización.

Primero y principal agradecer a Dios por sus continuas bendiciones.

A la tutora por su capacidad de entrega para llevar adelante este trabajo.

Y para finalizar realizo un reconocimiento especial a mi esposo por su apoyo continuo e invaluable en todas las actividades que emprendo en mi vida.

ROL DE LAS ENFERMERAS EN LA DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

RESUMEN

La violencia de género es un problema de salud pública, se refiere a cualquier daño físico, sexual o psicológico que la mujer sufra por parte de su pareja íntima, y forma parte del trabajo de las enfermeras la detección, recogida de datos y acompañamiento de las mujeres que atraviesan una situación de violencia.

Objetivo: Reconocer en la literatura existente el rol de las enfermeras en la detección de la violencia de género.

Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos: pubmed, Cochrane, Cinahl, Ebsco host, y Lilacs. Los términos de búsqueda fueron “violence against women”, “nurses roles”, y “violence screening”. Los idiomas escogidos fueron: inglés, español y portugués y se acotó como límite 10 años.

Resultados: Se encontraron en total 108 artículos, después de leer el abstract y de filtrar con criterios de inclusión, quedaron 77 artículos. Posteriormente de la eliminación de los que no se correspondían con el tema de interés mediante la lectura de los títulos y contenidos, quedaron un total de 31 artículos elegibles para incluirlos en la revisión, aunque de estos, 10 artículos se excluyeron por estar duplicados lo que deja un total final de 21 artículos.

Discusión: La mayor parte de los estudios analizados se encuentran dentro del nivel de evidencia relativamente bajo por lo que se considera la necesidad de estudios con niveles superiores para la producción de conocimiento en las investigaciones sobre el tema.

Conclusión: La enfermera es de los primeros profesionales que entran en contacto con mujeres en situaciones de violencia de aquí la importancia de su rol, y tiene la responsabilidad de identificar los casos, y orientarlos en búsqueda de soluciones en la red de atención a la violencia. En vistas de los resultados obtenidos y el porcentaje de mujeres que quedan sin pesquisar por enfermería se hace evidente la necesidad de continuar insistiendo en la formación profesional, delimitar las barreras por las que no se realiza la captación y buscar estrategias para enfrentar este problema.

Palabras claves: Violencia de género, funciones de enfermería, detección de violencia contra la mujer, abordaje de violencia, violencia de pareja íntima.

ABSTRACT

Gender-based violence is a public health problem, it refers to any physical, sexual or psychological harm that women suffer from part of their intimate partner, and it is part of the nurses' job to detect, collecting data and accompanying women in a situation of violence.

Objective: Recognize in the existing literature the role of nurses in the detection of gender violence.

Method: A bibliographic search was performed in the databases: Pubmed, Cochrane, Cinahl, Ebsco host, and Lilacs. The search terms were "violence against women", "nurses roles", and "violence screening". The languages chosen were: English, Spanish and Portuguese and were limited to 10 years.

Results: A total of 108 articles were found, after reading the filter with inclusion criteria, there were 77 articles. After the removal of those that did not correspond to the topic of interest by reading the titles and contents, there were a total of 31 articles eligible for inclusion in the review, although of these, 10 articles were excluded for being duplicated which leaves a final total of 21 articles.

Discussion: Most of the studies analyzed are within the relatively low level of evidence, so it is considered the need for studies with higher levels for the production of knowledge in research on the subject.

Conclusion: The nurse is one of the first professionals to come into contact with women in situations of violence, hence the importance of their role, and has the responsibility of identifying cases, and guiding them in search of solutions in the network of attention to violence. In view of the results obtained and the percentage of women who are not investigated by nursing, it is clear that there is a need to continue insisting on vocational training, to identify the barriers by which recruitment is not carried out and to seek strategies to deal with this problem.

Keywords: Gender violence, nursing functions, detection of violence against women, violence approach, intimate partner violence.

RESUM

La violència de gènere és un problema de salut pública, es refereix a qualsevol dany físic, sexual o psicològic que la dona pateixi per part de la seva parella íntima, i forma part del treball de les infermeres la detecció, recollida de dades i acompanyament de dones que travessen una situació de violència.

Objectiu: Reconèixer a la literatura existent el rol de les infermeres en la detecció de la violència de gènere.

Mètode: Es va realitzar una recerca bibliogràfica a les bases de dades: pubmed, Cochrane, Cinahl, Ebsco host, i Lilacs. Els termes de cerca van ser “violence against women”, “nurses roles”, i “violence screening”. Els idiomes escollits van ser: anglès, espanyol i portuguès i es va ajupir com a límit 10 anys.

Resultats: En total es van trobar 108 articles, després de llegir l'abstract i de filtrar amb criteris d'inclusió, van quedar 77 articles. Posteriorment de l'eliminació dels que no es corresponien amb el tema d'interès mitjançant la lectura dels títols i continguts, van quedar un total de 31 articles elegibles per incloure'ls a la revisió, encara que d'aquests, 10 articles es van excloure per estar duplicats el que deixa un total final de 21 articles.

Discussió: La major part dels estudis analitzats es troben dins del nivell d'evidència relativament baix, per la qual cosa es considera la necessitat d'estudis amb nivells superiors per a la producció de coneixement a les investigacions sobre el tema.

Conclusió: La infermera és dels primers professionals que entren en contacte amb dones en situacions de violència d'aquí la importància del seu rol, i té la responsabilitat d'identificar-ne els casos, i orientar-los en la recerca de solucions a la xarxa d'atenció a la violència . En vista dels resultats obtinguts i el percentatge de dones que queden sense indagar per infermeria es fa evident la necessitat de continuar insistint en la formació professional, delimitar les barreres per les quals no es realitza la captació i cercar estratègies per enfrontar aquest problema.

Paraules clau: violència de gènere, funcions d'infermeria, detecció de violència contra la dona, abordatge de violència, violència de parella íntima.

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	4
ESTRATEGIA DE BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA	5
Criterios de exclusión e inclusión	5
RESULTADOS DE LA BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA	8
DISCUSIÓN	12
CONCLUSIÓN	16
BIBLIOGRAFÍA	17

INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo la violencia hacia la mujer es quizás una de las violaciones de derechos humanos más extendida y antigua, impide total o parcialmente a la mujer gozar de sus derechos y libertades conformando de esta forma una demostración de relaciones de poder y desigualdades entre el varón y la mujer (1).

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer: como todo acto de violencia de género que proceda, o que pueda conducir a un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Se incluyen también las amenazas de tales actos o el mero hecho de la privación de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada (2).

En España Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género la expresa como violencia física y psicológica, y también incluye las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, coacción o privación unilateral de libertad (3).

La violencia de género afecta a mujeres en todas las edades, clase social, situación laboral, nivel educativo, ideología política o religiosa siendo sin lugar a dudas, la manifestación más extrema la muerte de las mujeres por parte de sus parejas o ex parejas (4).

Los estudios de género demuestran aun al día de hoy, la permanencia y vigencia de los estereotipos culturales que atribuyen más valor a lo masculino que a lo femenino, ubicando jurídica y psicológicamente a varones y mujeres en distintos niveles jerárquicos, los estereotipos de género son perjudiciales ya que limitan la capacidad de las mujeres para desarrollarse personal y profesionalmente, así como también para tomar decisiones en sus vidas (5).

En las últimas décadas se ha acrecentado la violencia convirtiéndose en un problema del ámbito de salud pública, no solo porque mueren millones de personas como consecuencia de la violencia, sino también por las secuelas que acarrea, representando así un problema de salud y un importante factor de riesgo psicosocial, por la magnitud del daño, la invalidez o muerte que provoca, también repercutiendo en los planos social, psicológico y biológico a corto y largo plazo.

En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud hizo público que la violencia es un importante problema de salud pública en esferas mundiales, la importancia radica en que es prevenible y su impacto se puede limitar, por ello debemos trabajar abordándola en la salud desde la prevención y captación en post de procurar una mejor calidad de vida para quienes la padecen (6).

La cantidad de mujeres que padecen violencia en el mundo según los datos recogidos por ONU mujeres, se presenta con las siguientes cifras:

- A diario son asesinadas 137 mujeres por allegados de su familia, 87.000 fueron asesinadas en el año 2017 en todo el mundo, de ellas más de la mitad por un familiar o pareja.
- En las mujeres que padecieron violencia física o sexual por parte de su pareja hubo un mayor aumento de casos de depresión, abortos e infección por VIH
- En todo el mundo se estima que 15 millones de adolescentes entre 15 y 19 años fueron obligadas a tener relaciones sexuales forzadas, representando esta franja etaria las mujeres con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales por parte de su esposo, pareja o novio actual o anterior, y tan sólo un 1 % de ellas pidió alguna vez ayuda profesional (7).

En todo el territorio español el número de denuncias por violencia de género durante el año 2022 fue de 87.508 mujeres.

Las víctimas mortales hasta diciembre de 2022 sumaron 40 mujeres, un total de 25 asesinadas por su pareja, 9 por su ex pareja y 6 por su pareja en el periodo de separación.

De las 40 víctimas asesinadas por violencia de género, solamente un total de 16 mujeres habían presentado denuncia.

Específicamente en las Islas Baleares las denuncias por violencia de género en el año de 2022 hasta diciembre sumaron un total de 3.195 denuncias (8)

En España existe desde el año 2007 un “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género”, elaborado de forma colectiva por el Observatorio de Salud de la Mujer, de la Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo y por la Comisión contra la Violencia de Género, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; consensuado por representantes de la administración central y las autonómicas.

El objetivo principal de este protocolo es establecer y proporcionar a los profesionales sanitarios una pauta de actuación única para el Sistema Nacional de Salud (SNS) en los casos de violencia específicamente contra las mujeres. Las pautas se aplican tanto en la atención y monitoreo posterior, en la prevención y captación temprana de los casos detectados brindando una atención integral que abarque también lo psicológico, emocional y social a las mujeres que padecen violencia de género y que acuden a un centro sanitario (9).

También desde el Consejo General de Enfermería español se especifica que hay dos ámbitos importantes para que sea efectivo el abordaje de la mujer que padece violencia: el educativo y también el sanitario. Con respecto al ámbito educativo; en la formación se debe enseñar a realizar la entrevista psicosocial y la adquisición de habilidades para acoger escuchar y brindar contención a las víctimas. Y a nivel sanitario el desarrollo de programas formativos con el objetivo de suministrar herramientas a las enfermeras para poder detectar, informar y evaluar la violencia de género.

Se entiende entonces que las enfermeras representan un grupo fundamental en la atención, prevención, detección precoz e identificación de la violencia de género, siendo una pieza primordial en el seguimiento del proceso, el asesoramiento y apoyo psicológico, en la garantía de la continuidad de cuidados, siendo una referente, cercana y accesible a la mujer durante todo el proceso. La formación de los profesionales de enfermería es esencial para hacer frente a este problema (10).

Las enfermeras suelen ser las primeras en atender a las mujeres que han sufrido violencia, su comportamiento e intervenciones deben ser equilibradas y respetuosas, y entender que están en una posición única para intervenir adecuadamente y realizar más investigaciones en esta área (11).

Sin embargo, las enfermeras no pueden lograr poner fin a la violencia contra las mujeres si no se aborda el problema de forma interdisciplinaria, entendiéndose que también ello requiere de un cambio sistémico e inversión en capacitación, desarrollo e investigación (12).

En mi experiencia como enfermera, dado que soy enfermera titulada en Uruguay y actualmente estoy en proceso de homologación, considero que la captación de la violencia contra la mujer es de suma importancia en la práctica diaria de enfermería, por eso mi interés

a través de este trabajo es recopilar la bibliografía existente respecto al vínculo de enfermería con la violencia de género y dar respuesta a través de la revisión de la literatura a la pregunta de investigación ¿Cuál es el rol de las Enfermeras/os en la detección de la violencia de género?, y así también dar lugar a conocer si las enfermeras realizan detección de la violencia de género y reconocer el eje de actuación en su abordaje.

Desde mi punto de vista hoy día la violencia de género constituye entre otros tantos, un problema de salud pública, la atención a las mismas debe ser interdisciplinar y las enfermeras tendrán que estar implicadas de lleno en lo relacionado a este flagelo que tiene fuerte implicancia para el sector salud y también en lo social. Considerando lo anterior este trabajo podrá contribuir a visibilizar la problemática y dar un enfoque para elaborar contenidos a futuro.

OBJETIVO GENERAL

- Analizar el rol de las/os enfermeras/os en la detección de la violencia de género.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1: Evaluar si las/os Enfermeras/os realizan detección de violencia de género en su práctica diaria
- 2: Identificar el eje de actuación de las/os enfermeras/os para el abordaje de la violencia de género

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

La pregunta de revisión fue: ¿cuál es el rol de las/os enfermeras/os en la detección de la violencia de género?

Se llevó a cabo una búsqueda de la literatura, en las bases de datos: Pubmed, Medline, Cochrane, LILACS, EBSCOhost y Cinahl a las cuales se obtuvo el acceso desde la biblioteca de la UIB.

Las palabras claves utilizadas fueron: Violencia de género, funciones de enfermería, detección de violencia contra la mujer, abordaje de violencia, gender violence, nurses function, detection of violence against women, approach of violence, violencia de pareja íntima.

En la estrategia de búsqueda se utilizaron los Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) y Medical Subject Headings (MeSH) en castellano/inglés, combinando dichos términos con el operador booleano AND, que fueron: Violence against women AND Nurse's role AND violence screening.

Para realizar la introducción también se consultan documentos de interés a través de páginas web de organismos internacionales: Organización Mundial de la Salud (OMS), ONU (naciones unidas), páginas web de gobiernos nacionales: INE, Observatorio Estatal de violencia contra la mujer (Ministerio de igualdad), y el protocolo común para la actuación sanitaria.

Criterios de exclusión e inclusión

Inclusión: se han incorporado a este trabajo final de grado artículos relacionados con la violencia de género en mujeres. Aquellos que vinculan la violencia de género y el papel de las enfermeras. Y artículos que hablan sobre la detección y valoración de las mujeres.

Exclusión: se han excluido investigaciones llevadas a cabo en países no latinos, asumiendo que el contexto cultural cambia la comprensión del fenómeno.

Se han excluido investigaciones en Turquía, Japón y (algún país árabe).

También se han excluido artículos relacionados con población adolescente como víctimas, y con rol de estudiantes de enfermería.

Los límites establecidos en la búsqueda han sido: - publicaciones entre los años 2013-2023,
- los idiomas incluidos fueron inglés, español, italiano y portugués
- las áreas de conocimiento abordadas para la búsqueda fueron Salud, Ética, Psicología, y sociología.

La realización de la búsqueda bibliográfica fue ingresando al catálogo de la biblioteca UIB en calidad de estudiante.

En todas las bases de datos se utilizará como filtro publicaciones realizadas entre 2013 y 2023 y luego del total de artículos, los criterios de inclusión y exclusión ya nombrados para la elección de los artículos que se analizarán.

A continuación, se menciona en orden y detalladamente como fue la búsqueda que se realizó con miras a que el lector de este estudio pueda realizarla de la misma forma.

La primera búsqueda fue realizada en el portal de BVS y utilizando búsqueda avanzada se filtraron con los descriptores Violence against women AND nurses role, la primer base de datos consultada fue Medline teniendo como filtros aplicados en cuenta como criterio de exclusión los últimos diez años, con lo cual se obtiene un total de 44 artículos de los resultantes y, utilizando los criterios de inclusión y exclusión un número de 6 artículos son elegibles no habiendo repeticiones por ser la primer base de datos consultada.

Posteriormente a través de la BVS se realiza el filtro en la base de datos Lilacs y los descriptores violence against women AND nurses role donde se recaban 17 artículos de los cuales 5 cumplen con los criterios de inclusión.

La próxima búsqueda se realizó en la base de revisiones Cochrane library Plus, aplicando el recurso Cochrane library y escribiendo en la búsqueda avanzada el descriptor violence against women se consiguen así 3 artículos de los cuales 1 es elegible.

Siguiendo la búsqueda se analiza la base de datos Pubmed donde se utilizaron los descriptores violence against women AND nurses role AND violence screening obteniendo 9 artículos disponibles de los cuales 1 fue elegible y 3 fueron excluidos por estar repetidos

A continuación, en el metabuscador Ebscohost fue aplicado un filtro por bases de datos suscritas y se realizó una selección de base de datos relacionadas a sociología, medicina,

psicología, violencia y abuso. Los descriptores utilizados fueron violence against women AND nurses role se obtienen 14 artículos 2 elegibles y 3 repetidos.


La última base de datos seleccionada a través de Ebscohost fue Cinahl donde se realizó la búsqueda avanzada mediante los descriptores violence against women AND nurses role se obtuvo un total de 21 artículos de los que 6 cumplían los criterios de inclusión y 4 se excluyeron por estar repetidos.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

En este apartado, se presenta en la figura 1 el diagrama de flujo que representa el proceso seguido para elegir los estudios relevantes mediante las bases de datos consultadas a través de la biblioteca UIB, en cada una se especifica la cantidad de artículos encontrados, el posterior cribado seguidos por los estudios analizado y posterior exclusión de los artículos que estaban duplicados para obtener al finalizar el número total de artículos incluidos en la síntesis final.

Se encontraron en total 108 artículos, después de leer el abstract y de filtrar con los criterios de inclusión, quedó compuesto por 77 artículos. A continuación, se realizó la eliminación de artículos que no se correspondían con el tema de interés mediante la lectura de los títulos y contenidos, de esta manera queda un total de 31 artículos elegibles para la lectura e incluirlos en la revisión, aunque de este total, 10 artículos se excluyeron por estar duplicados lo que deja un total final de 21 artículos incluidos.

Figura 1: Diagrama de flujo de la información a través de las diferentes fases de RS



Fuente; elaboración propia

Se realizó una síntesis de la evidencia científica disponible, mediante la lectura de los artículos seleccionados para la elaboración de la revisión, se tuvieron en cuenta solamente los que respondían a los objetivos para una mejor comprensión del tema

Para revisar el rigor y la validez de los artículos se utilizó el programa de lectura crítica Caspe.

Luego del análisis de los artículos se obtuvo un nivel de evidencia para cada uno de ellos lo que puede apreciarse detalladamente en el anexo 1 la tabla 2: artículos seleccionados para la revisión, que corresponde a los artículos seleccionados luego de realizar Caspe y los niveles de evidencia y grados de recomendación del el Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

El mayor porcentaje de artículos analizados, 8 en total, tuvo un nivel de evidencia 2 + resultando un 38 %, 3 artículos correspondieron a la opinión de expertos totalizando un 14% con nivel de evidencia 4, 5 artículos que fueron revisiones sistémicas tuvieron un nivel de evidencia 1 – totalizaron un 24%, y por último 5 artículos que fueron estudios de casos también totalizando un 24%.


Se representa en la tabla 1 el total de artículos y su nivel de evidencia y, en el grafico 1 el porcentaje de artículos y los niveles de evidencia Sign.

Tabla 1. Número total de artículos y nivel de evidencia Sign

Total de artículos	Nivel de evidencia Sign
3	4
8	2+
5	1-
5	2-

Fuente; elaboración propia

Gráfico 1. Porcentaje de artículos y niveles de evidencia Sign



Fuente; elaboración propia

En el anexo 2 tabla 3 se presenta la ficha técnica para apoyar las revisiones bibliográficas. En ella se detallan cada artículo, de lo que se puede obtener como resultado que los artículos con evidencia científica más alta fueron en su mayoría publicados en la base de datos Medline.

La mayor cantidad de artículos fueron realizados en Brasil (9 artículos) pero predominantemente con un nivel de evidencia bajo.

Los estudios internacionales presentaron mejor evidencia que los de España, así como también los realizados en Sudamérica Brasil y Venezuela, fueron analizados artículos de Reino Unido, Estados Unidos México, India Venezuela y Eslovenia.

Del total de los artículos analizados el tipo de estudio fue mayormente cuantitativo conformado por 9 artículos, seguido por revisiones bibliográficas 7 artículos, 2 casos control, 2 descriptivo y 1 cualitativo.

DISCUSIÓN

El rol de enfermería en la detección de violencia de género fue analizado en varios artículos, algunos destacan que la intervención realizada por las enfermeras tiene el potencial de mejorar la salud mental, la seguridad y comportamientos de planificación a corto plazo, sin embargo, no así a largo plazo, y que pueden desempeñar un papel de apoyo en ayudar a las mujeres con experimentan violencia de género (13).

Otros refuerzan que la enfermera es la figura principal que recibe a las mujeres, tanto en atención primaria como en urgencias, y que debe brindar un diálogo amistoso, logrando generar un vínculo de confianza y seguridad, promoviendo la intimidad para que las mujeres se sientan cómodas y así poder contar lo sucedido para poder a priori tomar decisiones prioritarias (14).

Con lo anteriormente descrito coincide otra revisión cuyos resultados demuestran que las enfermeras tienen un notorio rol en la atención de la violencia de género, ya que son de los primeros profesionales en recibir a las mujeres en los servicios de salud y dar inicio a las acciones de escucha, seguimiento y prevención de los daños ocasionados por la agresión, además de intentar lograr posteriormente la resocialización de estas mujeres (15).

Los resultados demuestran que las acciones de atención a la salud llevadas a cabo por enfermería se basan en elementos clínicos y no clínicos. Los clínicos se refieren a los procedimientos y técnicas de enfermería; realizar la atención inicial de lesiones y traumatismos que son consecuencia de la violencia, y, los no clínicos incluyen el diálogo, escucha y orientación; referencias, o no, de mujeres y reuniones de equipo (16).

En la propuesta de investigación de un trabajo realizado en Eslovenia se concluye que el porcentaje de violencia de género denunciada al personal de salud es bajo (9,3% a 20,8%). Algunas mujeres que sufrieron violencia no pidieron ayuda: una décima parte de las que sufrieron violencia física, una quinta parte de los que sufrieron abusos psicológicos, y un tercio de las que fueron abusadas sexualmente (17).

En otro artículo que se realizó con una muestra reducida de participantes. se reveló que el rol de la enfermera lleva en sí acciones de escucha activa, promoción y prevención, fomentar el empoderamiento, notificación y trabajo en red con otros servicios (18)

En respuesta a los objetivos de este trabajo, fueron encontrados que son varios los trabajos que ponen de manifiesto que el compromiso de enfermería en la detección de víctimas que padecen violencia de género en su práctica diaria se ve afectado por la falta de conocimientos. A menudo el proceso de identificación y denuncia de casos de violencia de género se ve obstaculizado por la falta de conocimientos de las enfermeras y el miedo a involucrarse con el caso. En varias ocasiones confunden el hecho de notificar con la denuncia y la criminalización, esto genera la invisibilidad del problema. Para trabajar de forma eficiente en la detección de casos de violencia de género en los servicios de salud es necesaria la capacitación, reflexión y apoyo a las enfermeras de forma que logren sentirse seguras (19). Una de las limitaciones de este estudio es que se realizó con una muestra reducida de participantes.

Los hallazgos se incorporan a la evidencia sobre las experiencias y percepciones de los profesionales de la salud sobre la capacitación en respuesta a la violencia de género incluyendo la falta de recursos humanos, el tiempo que se designa a la atención en la práctica clínica habitual y la falta de redes de derivación sólidas (20).

En otra investigación en la mayoría de las enfermeras entrevistadas se detectó desconocimiento para asumir la prevención y asistencia del problema de violencia, se evidenció que fueron las propias pacientes quienes contaron encontrarse en una situación de violencia por parte de su pareja, esto podría sugerir una carencia del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, debido a que no es de rutina el interrogatorio a las mujeres sobre este tipo de antecedentes (21).

La evidencia de que la formación podría mejorar la postura de los profesionales frente al flagelo de violencia de género es débil en general. La confianza de los hallazgos es débil y se presenta riesgo incierto de sesgo. El conocimiento podría mejorar con la formación y la preparación percibida por el propio profesional sanitario para dar respuesta a las situaciones, pero no hay total seguridad acerca de esta evidencia (22)

Se necesitan más estudios de investigación que superen estas limitaciones y que evalúen los efectos de la formación.

Otra investigación llevada a cabo con una muestra pequeña de 7 enfermeras, reveló que las enfermeras saben reconocen conceptos importantes sobre el tema de la violencia, pero no así la remisión y seguimiento. Se demuestra que no hay un seguimiento del fenómeno porque tercerizan la asignación para el servicio social y desconocen la mayoría de las referencias a otros servicios o los conocen en forma fragmentada (23).

Todos los artículos revisados coinciden en que la captación y atención de las mujeres víctimas de la violencia por parte de enfermería, aún es débil notándose que la asistencia necesita que exista un mayor enlace con las redes de apoyo, y formación continua de enfermería sobre la temática y los distintos protocolos y reglamentos acerca de la notificación de los casos que se consideran sospechosos (24).

Los resultados revelan la importancia de capacitar a los trabajadores de la salud para evitar el miedo por lo desconocido. Estudios como éste concluyen la necesidad de investigar este fenómeno y plantean interrogantes sobre la dinámica organizativa de los servicios de salud y la responsabilidad de los gestores de proporcionar y fomentar la formación a los profesionales de enfermería (25).

Además, los resultados obtenidos confirman que el eje de actuación de enfermería se extrapola a los distintos sectores y niveles de los servicios sanitarios por lo cual se puede realizar en cualquiera de ellos el abordaje a mujeres que sufren violencia de género.

Un artículo demostró que en la población de pacientes de traumatología mejoraron los índices de identificación de violencia de género a través de un cuestionario de 20 segundos que lo combinaban a la evaluación de detección de drogas y alcohol. Es responsabilidad de enfermería identificar, intervenir y abogar por las mujeres que padecen violencia por parte de sus parejas cuando acuden a un departamento de emergencia o a cualquier otro entorno sanitario (26).

Otros trabajos han puesto en evidencia el eje de actuación de enfermería en otros sectores, por ejemplo, la detección de la violencia de género en los departamentos de emergencia también lo realiza enfermería, como menciona la literatura generalmente se realiza utilizando instrumentos electrónicos, cara a cara o con lápiz y papel. Las pruebas de detección de rutina o universales dan como resultado tasas más altas de identificación de violencia de pareja

íntima. Las mujeres que fueron captadas y tuvieron resultado positivo para violencia de pareja íntima en los departamentos de emergencia, tienen más probabilidades de experimentar violencia en los próximos meses (27).

Si bien hay evidencia que avala la importancia de contar con enfermeras un estudio en Italia pone de manifiesto que en los centros anti violencia no disponen de enfermeras para la continuidad del cuidado, teniendo que derivar a las mujeres víctimas de violencia de género al servicio de urgencia lo que vuelve a revictimizar a la mujer (28).

Una investigación también en Italia comparó un estudio que tenía el objetivo de describir el conocimiento, actitudes y creencias de las enfermeras y matronas hacia las mujeres víctimas de violencia. realizado en 2008 con el mismo vuelto a realizar en 2013. Los hallazgos indican que: - un mayor porcentaje de participantes (80,4%) atendió a mujeres que sufrieron violencia sexual o familiar respecto a 2008 que fue el 72,7% del total.

- La presencia de procedimientos o protocolos se incrementa 88,2% vs. 75%.
- Ha disminuido el porcentaje de quienes detectan violencia, 49% vs. 68,2% en 2008.
- También disminuyó el porcentaje de quienes afirman tener dificultades en el abordaje de mujeres maltratadas: del 78,1% anterior al 70,7% actual.
- Quienes consideran la activación de la red de salud la principal 'oferta' a una mujer maltratada ha aumentado (27,5% frente al 22,7% anterior).
- El porcentaje de encuestados que considera importante brindar información detallada y completa a las mujeres disminuyó a 78,4% frente al 84,1% anterior (11).

Los resultados a nivel de la actuación de enfermería en APS señalan que la enfermera es de los primeros profesionales en contactar con mujeres en situaciones de violencia, teniendo la gran responsabilidad de reconocer los casos, y guiar a las mujeres en la búsqueda de soluciones ayudándolas a contactar en la red de atención a la violencia que involucra a varios otros sectores, como: asistencia social, educación, asistencia legal, etc. (29).

Lo anteriormente descrito se alinea con otro trabajo que menciona el papel fundamental de Enfermería de Atención Primaria por su acceso y contacto frecuente con la mujer durante las diferentes etapas de su vida, por lo que puede detectar precozmente si esta padece situaciones de violencia (30).

CONCLUSIÓN

La violencia de género es un grave problema de salud pública que tiene repercusión en la salud de las mujeres que la sufren.

Si bien queda claro a mi entender que el rol de enfermería es indispensable para la detección, cuidado, seguimiento y derivación de mujeres víctimas de violencia se denota a través de la literatura que hay una clara necesidad de la calificación del equipo de enfermería y de desconocimiento acerca del tema.

La literatura hace reflexionar acerca de lo más relevante e indispensable que debe realizar enfermería durante la asistencia como: no juzgar, escuchar, evitar juicios de valor, no reforzar estereotipos de culpa y victimización, también garantizar el secreto, dando a entender que la consulta es un espacio seguro y que los registros son confidenciales.

Aunque la enfermería por sí sola no puede abordar todo lo concerniente a la víctima de forma integral e integrada, sino que se debe trabajar en equipo con otros profesionales del sistema sanitario y en concordancia con redes de ayuda, pero también deben tomar las riendas las instituciones de salud brindando formación, trabajando para sensibilizar a todos los proveedores de atención del sistema sanitario y alentar la detección rutinaria de la violencia de género por parte de enfermería, así como elaborar protocolos para un manejo adecuado.

Este trabajo pone de manifiesto la necesidad a futuro de la planificación de estrategias interdisciplinarias de prevención, captación, seguimiento, conocimiento de las distintas redes de apoyo, políticas públicas, protocolizar la atención en cada centro de trabajo, para abordar los desafíos y complejidades que trae asociadas la violencia de género.

En vistas de los resultados obtenidos y el porcentaje de mujeres que quedan sin pesquisar por enfermería se hace evidente la necesidad de continuar insistiendo en la formación profesional, delimitar las barreras por las que no se realiza la captación y buscar estrategias para enfrentar este problema. Así como también, la necesidad de que las instituciones insten a sus trabajadores a cumplimentar con los registros.

Será necesaria realizar más investigaciones y con mejor evidencia porque la importancia de conocer la incidencia real de la violencia de género favorecerá la implementación de estrategias y líneas de seguimiento, de involucramiento del estado y la comunidad en sí misma.

BIBLIOGRAFÍA

¹ Naciones Unidas [sede Web]. Ginebra: ACNHUD. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; [citado abril 10 de 2023]. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>.

² Organización de las naciones unidas [sede Web]: ONU Mujeres. Preguntas frecuentes: tipo de violencia contra las mujeres y las niñas; [citado abril 10 de 2023]. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence>

³ Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. [Internet], 28 de diciembre 2004 [citado abril 15 de 2023]. España. Disponible en: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/definicion/pdf/LEY_ORGANICA_1_2004contraviolencia.pdf

⁴ Instituto nacional de estadística. [sede Web]: Delito y violencia (actualizado 21 enero 2022). Víctimas mortales por violencia de género [citado abril 20 de 2023]. España. Disponible en: https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=%5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalle¶m3=1259924822888

⁵ Naciones Unidas [sede Web]. Ginebra: ACNHUD; [citado 20 marzo 2023]. Derechos humanos. Estereotipos de género. El ACNUDH y los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/women/gender-stereotyping>

⁶ González Leal G, Pardo Gómez M, Izquierdo JM. La violencia como problema de salud pública en Venezuela: algunas reflexiones desde la perspectiva del profesional de seguridad ciudadana. MEDISAN [Internet]. 2017 [citado 13 febrero de 2023]; 21(5): 642-649.

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017000500020&lng=es.

⁷ Organización de las Naciones Unidas. [sede Web]. EEUU ONU Mujeres. Mujeres Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres; 2020 [citado 10 febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures>.

⁸ Portal Estadístico [sede Web]. España. AgeDelegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de igualdad; 2023[citado 20 marzo de 2023]. Disponible en:<http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/>

⁹ Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género.España. Sanidad 2007 ministerio de sanidad y consumo. Disponible en: <https://www.sanidad.gob.es/eu/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/protocoloComun.pdf>

¹⁰ Pérez García C. La práctica clínica enfermera en el abordaje de la violencia de género. Cul. Cuid. [Internet]. 13 de enero de 2015 [citado 7 de marzo de 2023];(40):107-15. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10045/43947>

¹¹ Di Giacomo, P., Cavallo, A., Bagnasco, A., Sartini, M., & Sasso, L Violence against women: knowledge, attitudes and beliefs of nurses and midwives. Journal of Clinical Nursing, [Internet]. 2017 [citado 7 de marzo de 2023];(26(15-16), 2307–2316. doi:10.1111/jocn.13625

¹² Patrick, L., & Jackson, L. The role of nurses in recognising and responding to violence against women. Journal of Clinical Nursing, [Internet]. 2022 [citado 7 de marzo de 2023];(31, e8–e10) Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jocn.16147>

¹³ Gupta, J., Falb, K. L., Ponta, O., Xuan, Z., Campos, P. A., Gomez, A. A., Olavarrieta, C. D. A Nurse-delivered, clinic-based intervention to address intimate partner violence among

low-income women in Mexico City: findings from a cluster randomized controlled trial. *BMC Medicine*, [Internet] 2017 [citado 7 de marzo de 2023] 15(1). Disponible en: [doi:10.1186/s12916-017-0880-y](https://doi.org/10.1186/s12916-017-0880-y)

¹⁴ Cordeiro AS, Silva ALA, Fernandes CTS, Nunes DC, Moraes-Filho IM. Importância do papel da enfermagem no atendimento à mulher vítima de violência e violência doméstica. *REVISA*. [Internet] 2022[citado 7 de marzo de 2023] 11(3): 77-93. Disponible en: Doi: <https://doi.org/10.36239/revisa.v11.n3.p77a93>

¹⁵ Melo EA, de Alcântara PPT, de Oliveira CAN, de Almeida RC, de Freitas MA, Soares LG. Mulheres Em Situação De Violência: Reflexões Sobre a Atuação Da Enfermagem. *Enfermagem Atual in Derme* [Internet]. 2022 [citado mayo 1 de 2023]; 96(40):1–8. Disponible en: <https://0-search-ebSCOhost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=162478514&lang=es&site=ehost-live>

¹⁶ Cortes LF, Padoin SM de M, Vieira LB, Landerdahl MC, Arboit J. Cuidar mulheres em situação de violência: empoderamento da enfermagem em busca de equidade de gênero. *Rev Gaúcha Enferm* [Internet]. 2015[citado mayo 1 de 2023] ;36 (sp):77–84. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2015.esp.57162>

¹⁷ Leskošek V, Lučovnik M, Pavše L, Sršen TP, Krajnc M, Verdenik I, Velikonja VG. The Role of Health Services in Encouraging Disclosure of Violence Against Women. *Zdr Varst*. [Internet] 2017 [citado abril 9 de 2023] 9;56(4):220-226. Disponible en: doi: 10.1515/sjph-2017-0030. PMID: 29062396; PMCID: PMC5639811.

¹⁸ Tracz R, Gonçalves AF, de Vargas Marcovicz G. Atuação Do (A) Enfermeiro (A) À Mulheres Vítimas De Violências. *Revista Científica de Enfermagem - RECIEN* [Internet]. 2022 Sep [citado marzo 20 de 2023];12(39):3–12. Disponible en: <https://0-search-ebSCOhost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=a9h&AN=160771098&lang=es&site=ehost-live>

¹⁹ Freitas RJM de, Sousa VB de, Costa T da SC e, Feitosa RMM, Monteiro ARM, Moura NA de. Atuação dos enfermeiros na identificação e notificação dos casos de violência contra

a mulher. hu rev [Internet] 2018 [citado marzo 28 de 2023];43(2):91-7. Disponible en: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/2585>

²⁰ Arora S, Bhate-Deosthali P, Rege S, Amin A, Meyer SR. Percepciones y experiencias de los proveedores de salud sobre la capacitación para responder a la violencia contra la mujer: resultados de un estudio cualitativo. *Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública*. [Internet] 2023[citado marzo 28 de 2023]; 20(4):3606. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph20043606>

²¹ Medina-Maldonado Venus Elizabeth, Landenberger Margarete, Rondón de Gómez Rosa, Osio Patrizzi Miguel. Experiencias de enfermeras en prevención de la violencia de género y asistencia a mujeres afectadas. *Rev Cubana Enfermer* [Internet]. 2015 Dic [citado marzo 29 de 2023]; 31(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192015000400006&lng=es.

²² Kalra, N., Hooker, L., Reisenhofer, S., Di Tanna, G. L., & García-Moreno, C. (2021). Training healthcare providers to respond to intimate partner violence against women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, [Internet]. 2021[citado marzo 29 de 2023]; Disponible en: doi: 10.1002/14651858.cd012423.pub2

²³ Vieira de Lima JC, Clemente dos Santos R, Chaves da Silva J, de Sousa Costa da Silva R, Ramos Medeiros Souto CM, Queiroga Souto R, et al. Tracking and Referral by Nurses in the Family Health Strategy of Violence Cases against Women. *Cogitare Enfermagem* [Internet]. 2020 [citado abril 7 de 2023]; 25:183–93. Disponible en: <https://0-search-ebshost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=142739719&lang=es&site=ehost-live>

²⁴ Silva Alexandre AC, Leite Sagueiro CDB, Gomes Gonçalves CF, Cordeiro Lopes J, da Silva Rodrigues JV, Correia Santos JL, et al. Violência de gênero sob a ótica e cuidado do enfermeiro: assistência à mulher vitimada. *Enfermagem Brasil* [Internet]. 2019 [citado abril 7 de 2023];18(1):141–8. Disponible en: <https://0-search-ebshost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=135533574&lang=es&site=ehost-live>

- ²⁵ Ferreira Acosta D, de Oliveira Gomes VL, de Oliveira DC, Corrêa Marques S, da Fonseca AD. Social representations of nurses concerning domestic violence against women: study with a structural approach. *Revista Gaucha de Enfermagem* [Internet]. 2018 [citado abril 7 de 2023];39(1):1–20. Disponible en: <https://0-search-ebSCOhost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=130881524&lang=es&site=ehost-live>
- ²⁶ Hewitt LN. Intimate partner violence: the role of nurses in protection of patients. *Crit Care Nurs Clin North Am.* [Internet]. 2015[citado abril 7 de 2023];27(2):271-5. Disponible en: doi: 10.1016/j.cnc.2015.02.004.
- ²⁷ Ahmad, I., Ali, P. A., Rehman, S., Talpur, A., & Dhingra, K. Intimate partner violence screening in emergency department: a rapid review of the literature. *Journal of Clinical Nursing*, [Internet]. 2017 [citado abril 7 de 2023]; 26(21-22), 3271–3285. Disponible en: doi:10.1111/jocn.13706
- ²⁸ Corazza A, Alberti A, Destrebecq A. Ruolo dell’Infermiere all’interno dei Centri Antiviolenza di Regione Lombardia. *Italian Journal of Nursing (IJN)* [Internet]. 2020 [citado marzo 20 de 2023];(33):36–42. Disponible en: <https://0-search-ebSCOhost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=146564095&lang=es&site=ehost-live>
- ²⁹ Santos do Vale Hiugo, Rodrigues da Rocha Mariana, Nunes da Conceição Hayla. Nursing Care for Women in a Situation of Violence in Primary Health Care. *Rev Cubana Enfermer* [Internet]. 2022 [citado marzo 20 de 2023]; 38(1): e4067. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192022000100017&lng=en. Epub Apr 22, 2022
- ³⁰ Baidés Noriega R. Role of Nursing in Secondary Prevention from Primary Care. *Enfermería Global* [Internet]. 2018 [citado abril 25 de 2023];17(3):497–508. Disponible en: <https://0-search-ebSCOhost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=a9h&AN=131347816&lang=es&site=ehost-live>

ANEXOS

ANEXO 1:

Tabla 2: Artículos seleccionados para la revisión

Any publicació	Autor principal	Lloc	Data de recollecció de dades	Inclusió de casos	Subjectes d'estudi	Fonts de dades	Mida mostral	Rang d'edat	Nivell d'evidència*
2021	Leanne Patrick, Laura Jackson	Reino Unido			Enfermeras	Medline			4
2015	Lisa N. Hewitt	Estados Unidos				Medline			4
2017	Gupta, J., Falb, K. L., Ponta, O., Xuan, Z., et al	México	2012-2015	42 clínicas de salud pública en las Ciudad de México	Mujeres heterosexuale	Medline	950 mujeres	18 -44	2 +
2017	Di Giacomo, P., Cavallo, A., Bagnasco, A., Sartini, M., & Sasso, L	Italia	2013	Emergencia obstétrica	Enfermeras y matronas	Medline	81 enfermeras y matronas		2+
2017	Ahmad, I., Ali, P. A., Rehman, S., Talpur, A., & Dhingra, K.	Reino Unido	2000-2015		Personal sanitario de emergencia	Medline	Enfermeras de emergencia		2 +

2023	Arora S, Bhate-Deosthali P, Rege S, Amin A, Meyer SR.	India	2019-2020	3 hospitales terciarios del estado	Enfermeras y médicos	Medline	220 enfermeras y médicos		2+
2018	Santos do Vale, Hiugo; Rodrigues da Rocha, Mariana; Nunes da Conceição, Hayla	Brasil	2018		Mujeres en situación de violencia	Lilacs			1-
2021	Adriana dos Santos Cordeiro, André Luis de Assis da Silva, Carla Thainá Santana Fernandes, Denoelma Carvalho Nunes, Iel Marciano de Moraes Filho	Brasil	2015-2021			Lilacs			1-
2017	Freitas, Rodrigo Jacob Moreira de; Sousa, Viviane Benício de; Cruz e Costa, Tathiane da Silva; Feitosa, Rúbia Mara Maia; Monteiro, Ana Ruth Macêdo; Moura, Natana Abreu de.	Brasil	2014	Emergencia	Enfermeros	Lilacs	10 enfermeros		2-
2015	Laura Ferreira Cortes Stela Maris de Mello PadoinLetícia Becker VieiraMaria Celeste LanderdahlJaqueline Arboit	Brasil	2013	Emergencia	Enfermera	Lilacs	10 enfermeras		2-

2015	Medina-Maldonado Venus Elizabeth, Landenberger Margarete, Rondón de Gómez Rosa, Osio Patrizzi Miguel.	Venezuela	2010	APS	enfermera	Lilacs	12 enfermeras	26-47	2-
2021	Naira Kalra, Leesa Hooker, Sonia Reisenhofer,, Gian Luca Di Tanna, Claudia García-Moreno	Estados Unidos	2020	19 ensayos	Profesionales sanitarios	Cochrane	1662 participantes		2+
2014	Leskošek V, Lučovnik M, Pavše L, Sršen TP, Krajnc M, Verdenik I, Velikonja VG	Eslovenia	2014	Maternidad	Puerperas	Pubmed	1272 mujeres		2+
2018	Raquel Baides Noriega	España	2008-2017			Ebsco host			1-
2021	Tracz R, Gonçalves AF, de Vargas Marcovicz G.	Brasil	2021			Ebsco Host	6 enfermeras		2-
2022	Melo EA, de Alcântara PPT, de Oliveira CAN, de Almeida RC, de de Freitas MA, Soares LG	Brasil	2022			Cinahl			4
2020	Vieira de Lima JC, Clemente dos Santos R, Chaves da Silva J, de Sousa Costa da Silva R, Ramos Medeiros Souto CM, et al.	Brasil	2018		Enfermeras	Cinahl	7 enfermeras		2-

2019	Silva Alexandre AC, Leite Salgueiro CDB, Gomes Gonçalves CF, Cordeiro Lopes J, da Silva Rodrigues JV, Correia Santos JL, et al	Brasil	2014 2017		Enfermera	Cinahl			1-
2014	Ferreira Acosta D, de Oliveira Gomes VL, de Oliveira DC, Corrêa Marques S, da Fonseca AD	Brasil	2014	2 Hospitales de Rio grande	Enfermeras	Cinahl	100	20 a 59 años	2+
2014	Pérez García C, Manzano Felipe M de los Á	España	2014		Enfermeras	Cinahl			1-
2020	Corazza, Arianna; Alberti, Annalisa; Destrebecq, Anne	Italia	2019	16 centros anti violencia (CAV)	Trabajadores de CAV	Cinahl			2+

* Escala SIGN per a dissenys quantitativs o classificació de Gálvez Toro per a dissenys qualitativs

ANEXO 2

Tabla 3: Ficha técnica para apoyar las revisiones bibliográficas

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
1					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Patrick, L., & Jackson, L. The role of nurses in recognising and responding to violence against women. Journal of Clinical Nursing, [Internet]. 2022 [citado 7 de marzo de 2023];(31, e8–e10) Disponible en: https://doi.org/10.1111/jocn.16147				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	<p>La violencia a manos de un hombre es el mayor factor que ocasiona la muerte, enfermedades y la discapacidad entre las mujeres de 18 a 44 años en todo el mundo, una encuesta de más de 22 000 mujeres del Reino Unido informa que el 99,7 % había sido víctima de violaciones, acoso y violencia física durante su vida.</p> <p>Las enfermeras pueden desempeñar un papel fundamental en reconocer y dar respuesta a la violencia contra las mujeres, el hecho de que no aborden adecuadamente este problema se relaciona al paternalismo médico y al dominio de la medicina sobre la jerarquía de la atención médica.</p>			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica	X	Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	

Any de realització	2021	
Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
	Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia	
	Escala (validada/no validada)	
	Registre de dades quantitatives	
	Tècniques qualitatives	Descriptivo
	Altres	
Població i mostra		
Resultats rellevants	Las enfermeras no conseguirán poner fin a la violencia contra las mujeres si no se aborda el problema de forma interdisciplinaria y sistémica, entendiendo que también ello de un cambio en el sistema e inversión en capacitación, desarrollo e investigación	
Discussió plantejada	Abordaje de enfermería en relación a la violencia contra la mujer	
Conclusions de l'estudi	<p>Las enfermeras tienen la responsabilidad de reconocer y responder a los signos de violencia contra la mujer, también protegerlas y velar por sus vidas.</p> <p>Sin embargo, las enfermeras por si solas no pueden lograr poner fin a la violencia contra las mujeres y, se requiere de un cambio en el sistema e inversión en capacitación, desarrollo e investigación. Los líderes y gerentes de enfermería deben priorizar e invertir en el desarrollo del conocimiento y la atención para</p>	

	<p>garantizar una enfermería y resto del personal de salud competentes para abordar este problema.</p> <p>También se deben reconocer y desafiar los sistemas opresivos y patriarcales que representa un obstáculo en el avance de la práctica y la comprensión de este fenómeno, de no ser así serán las mujeres las que seguirán sufriendo la carga de la indiferencia.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2	X	Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
2					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Hewitt LN. Intimate partner violence: the role of nurses in protection of patients. Crit Care Nurs Clin North Am. [Internet]. 2015[citado abril 7 de 2023];27(2):271-5. Disponible en: doi: 10.1016/j.cnc.2015.02.004				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	<p>Se estima que 4 de cada 10 mujeres en los Estados Unidos ha padecido algún tipo de violencia durante su vida.</p> <p>La IPV (intimate partner violence, sus siglas en inglés) puede causar lesiones inmediatas y también tener consecuencias a largo plazo, por ejemplo: depresión, suicidio, abuso de sustancias, trastornos gastrointestinales y dolor crónico.</p> <p>Las enfermeras son personal principal para la identificación e intervención de mujeres que padecen IPV.</p> <p>Utilizar un cuestionario de 20 segundos para la detección de violencia de pareja, y hacer preguntas sin juzgar podrán hacer la diferencia entre la vida y la muerte para muchas mujeres.</p>			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica	x	Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	
	Any de	2015			

	realització	
Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
	Enquesta/qüestionari d'elaboració propia	
	Escala (validada/no validada)	
	Registre de dades quantitatives	
	Tècniques qualitatives	descriptiva
	Altres	
Població i mostra		
Resultats rellevants	<p>La Evaluación de Violencia de Pareja intima consiste en un cuestionario de tres preguntas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Ha sido pateada, golpeada o lastimada de alguna manera por alguien en el último año? Si es así, por ¿quién? 2. ¿Se siente seguro en su relación actual? 3. ¿Hay algún compañero de una relación anterior que te haga sentir insegura ahora? <p>En la población de pacientes de traumatología se demostró que acoplar la evaluación de detección de drogas y alcohol (SBIRT) fue significativamente mejor en la detección de IPV.</p> <p>La combinación de la detección facilitó el ajetreado papel de la enfermería al vincular el PVS con SBIRT y mejorar la detección de violencia.</p> <p>Por seguridad de la encuestada la entrevista debe realizarse en privado, sin la presencia de la pareja o la familia.</p>	

Discussió plantejada	<p>El uso de una herramienta de detección rápida, así como folletos y/o carteles es una manera rápida y fácil de identificar y ayudar a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia.</p> <p>Para interrumpir el ciclo de abusos y prevenir el asesinato de mujeres, es fundamental que todos los servicios de salud desarrollen protocolos para la capacitación de profesionales y que se realicen protocolos y programas de captación e intervención de la IPV.</p>		
Conclusions de l'estudi	<p>Es responsabilidad de enfermería identificar, intervenir y abogar por las mujeres que padecen violencia por parte de sus parejas cuando acuden a un departamento de emergencia o entorno sanitario.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3	X	Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
3					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Gupta, J., Falb, K. L., Ponta, O., Xuan, Z., Campos, P. A., Gomez, A. A., Olavarrieta, C. D. A Nurse-delivered, clinic-based intervention to address intimate partner violence among low-income women in Mexico City: findings from a cluster randomized controlled trial. BMC Medicine, [Internet] 2017 [citado 7 de marzo de 2023] 15(1). Disponible en: doi:10.1186/s12916-017-0880-y				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	<p>El sector sanitario tiene un papel fundamental en captar la violencia contra la mujer por tener acceso a esta población, aunque no existe evidencia suficiente para guiar en el abordaje ni respuesta de las necesidades de estas mujeres.</p> <p>Un estudio realizado en México demostraba que el personal de enfermería experimentaba violencia de género en niveles similares a la población general, representando un obstáculo debido a la normalización de dicho comportamiento.</p> <p>Este estudio propone evaluar si un procedimiento puesto en práctica por enfermeras logra disminuir las cifras de violencia de género, mejorar los niveles de planificación, utilización de recursos, y la calidad de vida mental.</p>			
	Objectiu de l'estudi	Evaluar el impacto de una intervención realizada por enfermeras en mujeres que experimentaron violencia de pareja reciente en clínicas de salud pública en México.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica		Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	x
		Metaanàlisi		Cohort	

		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	
Any de realització	2012 – 2015				
Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat				
	Enquesta/qüestionari d'elaboració propia		Entrevista asistida		
	Escala (validada/no validada)				
	Registre de dades quantitatives				
	Tècniques qualitatives				
	Altres				
Població i mostra	Mujeres entre 18 y 44 años de edad				
Resultats rellevants	<p>Los resultados demostraron que de las 950 mujeres: 480 en control y 470 en tratamiento se observaron reducciones en la violencia por parte de su pareja íntima (OR, 0,40; IC 95 %, 0,28–0,55; P < 0,01) control (OR, 0,51; IC 95 %, 0,36–0,72; P < 0,01) clínicas.</p> <p>Sin embargo 15 meses después del inicio no se observaron efectos significativos (OR, 0,78; IC 95 %, 0,49–1,24; P = 0,30).</p> <p>De julio-diciembre de 2013, las mujeres en las clínicas de tratamiento informaron mejoras significativas, comparadas con las de control en los ítems: calidad de vida mental (β, 1,45; IC 95 %, 0,14–2,75; P = 0,03) y comportamientos de planificación de seguridad (β, 0,41; IC 95 %, 0,02–0,79; P = 0,04).</p>				

<p>Discussió plantejada</p>	<p>La investigación demuestra que es posible analizar y evaluar un programa de intervención de IPV en el sector salud con poblaciones vulnerables dentro de una megaciudad urbana.</p> <p>Cuando se les preguntó acerca de la IPV dentro de un entorno de atención médica por parte de la encuesta, el personal de investigación y las enfermeras también desencadenaron la autorreflexión y los cambios de comportamiento dentro de este grupo vulnerable</p> <p>En las limitaciones se aprecia que la intervención solo fue realizada por enfermeras seleccionadas, si bien se recomienda avanzar más hacia un enfoque de todo el sistema para prevenir y responder a la IPV dentro del sector de la salud.</p> <p>Otra limitación es que pudo haber una intervención de enfermería también en el grupo de control, ya que pueden haber proporcionado asesoramiento a los participantes más allá de lo que les pedía el protocolo del estudio.</p>
<p>Conclusions de l'estudi</p>	<p>Las enfermeras pueden ejercer un rol de apoyo en ayudar a las mujeres con experiencias de violencia de genero.</p> <p>Los resultados destacan que la intervención realizada por enfermeras tiene el potencial de mejorar la salud mental y la seguridad y comportamientos de planificación a corto plazo, sin embargo, no así a largo plazo.</p> <p>Existe la necesidad de realizar trabajos futuros donde deben considerarse intervenciones que involucren a enfermería y el personal sanitario en respuestas de abordar las necesidades de las mujeres que padecen violencia de género.</p>

Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4	X	Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
4					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Di Giacomo, P., Cavallo, A., Bagnasco, A., Sartini, M., & Sasso, L Violence against women: knowledge, attitudes and beliefs of nurses and midwives. Journal of Clinical Nursing, [Internet]. 2017 [citado 7 de marzo de 2023];(26(15-16), 2307–2316. doi:10.1111/jocn.13625				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	En Italia, el 12,3 % de las mujeres denuncian haber sufrido violencia de género según el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT 2015). Las recomendaciones de la OMS en el 2013 indican el papel de los proveedores de salud como fuente primaria para atender a las víctimas de violencia, reconociendo signos relacionados y recomendando los centros de acogida y apoyo. Distintos autores en 2009 y 2013 concluían que las matronas, médicos y enfermeras no están familiarizado con la consideración de la presencia de este problema y están mínimamente preparados para hacerlo (Lazenbatt et al.2009, Taylor et al. 2013).			
	Objectiu de l'estudi	Describir los conocimientos, actitudes y creencias de las enfermeras y matronas que han atendido a mujeres que sufrieron violencia.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica		Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	x
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	

Any de realització	2013	
Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
	Enquesta/qüestionari d'elaboració propia	cuestionario
	Escala (validada/no validada)	
	Registre de dades quantitatives	
	Tècniques qualitatives	
	Altres	
Població i mostra	81 enfermeras y matronas	
Resultats rellevants	<p>Cuarenta y un (80,4%) de los participantes eran mujeres, 35 (68,7%) tenían 40 años o menos, 31 (60,8%) eran enfermeros y 20 (39,2%) eran matronas.</p> <p>Cuarenta y cinco (88 2%) afirman que existe un plan, protocolo o procedimientos de atención a las mujeres violentadas en su departamento.</p> <p>Veintidós (43 1%) de los encuestados dicen haber asistido a cursos de formación específicos sobre el comportamiento adecuado seguimiento y manejo de casos de violencia.</p> <p>En particular 30 (58 9%) requerirían medidas específicas y más profundo conocimiento de los aspectos jurídicos y relacionales y de la aplicación del procedimiento</p> <p>El enfoque relacional/comunicativo presenta la mayor dificultad, y todos los operadores creen que necesita más conocimiento.</p>	

	<p>Veinte (45,1%) de los encuestados no creen que el comportamiento de la mujer pudo haber facilitado la violencia en sí, mientras que 10 (19,6%) creen que sí.</p>
Discussió plantejada	<p>Se comparó este estudio con el mismo realizado en 2008.</p> <p>Se evidencia que un mayor porcentaje de participantes (80,4%) atendió a mujeres que sufrieron violencia sexual o familiar respecto a 2008 que fue el 72,7% del total.</p> <p>La presencia de procedimientos o protocolos se incrementa 88,2% vs. 75%</p> <p>Ha disminuido el porcentaje de quienes detectan violencia, 49% vs. 68,2% en 2008.</p> <p>También disminuyó el porcentaje de quienes afirman tener dificultades en el abordaje de mujeres maltratadas: del 78,1% anterior al 70,7% actual.</p> <p>Quienes consideran la activación de la red de salud la principal ‘oferta’ a una mujer maltratada ha aumentado (27,5% frente al 22,7% anterior).</p> <p>El porcentaje de encuestados que considera importante brindar información detallada y completa a las mujeres disminuyó a 78,4% frente al 84,1% anterior</p> <p>Quienes creen que los comportamientos de la víctima han facilitado la violencia misma ha disminuido, aunque los datos siguen siendo importantes y no tienen una diferencia significativa ($p = 0,241$)</p>
Conclusions de l'estudi	<p>Se requieren más estudios para identificar y comprender por qué el fenómeno de la violencia contra la mujer sigue presentando dificultades para los operadores de la salud además de ‘culpar’ a la mujer.</p> <p>Las enfermeras suelen ser las primeras en atender a las mujeres que han sufrido violencia, su comportamiento e intervenciones deben ser equilibradas y respetuosas, y entender que están en una posición única para intervenir adecuadamente y realizar más investigaciones en esta área</p>

Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4	x	Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
5					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Ahmad, I., Ali, P. A., Rehman, S., Talpur, A., & Dhingra, K. Intimate partner violence screening in emergency department: a rapid review of the literature. Journal of Clinical Nursing, [Internet]. 2017 [citado abril 7 de 2023]; 26(21-22), 3271–3285. Disponible en: doi:10.1111/jocn.13706				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	<p>La violencia de género se reconoce como un problema social y de salud mundial. Durante las últimas décadas, se utilizaron varios términos para referirse a la violencia contra la mujer estos incluyen: abuso doméstico, violencia doméstica, violencia de género, violencia de pareja intima etc.</p> <p>La mayor parte de la literatura disponible está sesgada hacia mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja. Las investigaciones acerca de los métodos de detección de violencia y los factores que afectan la detección de la misma en los departamentos de emergencia son relativamente limitadas</p>			
	Objectiu de l'estudi	Identificar las intervenciones de detección de violencia de género utilizadas en los departamentos de emergencia y explorar los factores que afectan la detección de violencia de género en los departamentos de emergencia.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica	x	Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	

Any de realització	2017	
Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
	Enquesta/qüestionari d'elaboració propia	
	Escala (validada/no validada)	
	Registre de dades quantitatives	
	Tècniques qualitatives	observacional
	Altres	
Resultats rellevants	<p>Veintinueve estudios empíricos que cumplieran con los criterios de elegibilidad fueron evaluados de forma independiente.</p> <p>Se obtuvo como resultado que la detección de la violencia de género en los departamentos de emergencia generalmente se realiza utilizando instrumentos electrónicos, cara a cara o con lápiz y papel.</p> <p>Las pruebas de detección de rutina o universales dan como resultado tasas más altas de identificación de violencia de género.</p> <p>Las mujeres que fueron captadas y tuvieron resultado positivo en los departamentos de emergencia, tienen más probabilidades de experimentar violencia en los próximos meses.</p> <p>Los distintos factores que brindan una facilidad para la realización del cribado de la violencia de género se pueden clasificar en factores relacionados con: los profesionales sanitarios, factores organizativos y los relacionados con el paciente.</p>	

<p>Discussió plantejada</p>	<p>El entorno de urgencias presenta una oportunidad única para que los profesionales de la salud detecten situaciones de violencia de género.</p> <p>Los hallazgos de la revisión muestran que la mayoría de las investigaciones acerca del tema se llevan a cabo en países occidentales y desarrollados y destaca que la mayoría de los estudios realizados sobre este tema son cuantitativos.</p> <p>De acuerdo con investigaciones previas (Larkin et al. 1999, Olson et al. 1996), la detección rutinaria de violencia de género da como resultado tasas más altas de identificación.</p> <p>Si bien hay 33 cuestionarios de detección de violencia que se pueden utilizar, solo se ha realizado un pequeño número de estudios para validar estos cuestionarios.</p>		
<p>Conclusions de l'estudi</p>	<p>La competencia para evaluar las necesidades de los pacientes es un factor muy importante que puede afectar las tasas de revelación de violencia de género.</p> <p>Es necesario conocer los factores que afectan la detección de violencia en el servicio de urgencias desde la perspectiva de pacientes y personal de atención médica, así como también la realización de estudios cualitativos para conocer las experiencias subjetivas de los pacientes y de los profesionales de la salud en relación con la detección en el servicio de urgencias.</p>		
<p>Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi</p>	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3	X	Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
6					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Arora S, Bhate-Deosthali P, Rege S, Amin A, Meyer SR. Percepciones y experiencias de los proveedores de salud sobre la capacitación para responder a la violencia contra la mujer: resultados de un estudio cualitativo. Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública. [Internet] 2023[citado marzo 28 de 2023]; 20(4):3606. Disponible en: https://doi.org/10.3390/ijerph20043606				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	En India en 2019-2020 la Encuesta Nacional de Salud Familiar demostró que el 29% de las mujeres entre 18 a 49 años habían experimentado violencia de pareja íntima. En 2013, la OMS publicó las Directrices clínicas y recomendaciones de atención clínica para el fortalecimiento de los sistemas de salud, incluían: orientación sobre la capacitación de profesionales de la salud y mejora en la preparación del servicio para responder a la violencia de pareja. Sin embargo, es limitada la evidencia sobre cómo llevar a cabo estas recomendaciones en los servicios para dar respuesta en contextos de ingresos bajos y medianos.			
	Objectiu de l'estudi	Identificar barreras y facilitadores con respecto a la respuesta a la violencia contra las mujeres.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica		Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	x

	Any de realització	2019	
	Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
		Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia	
		Escala (validada/no validada)	
		Registre de dades quantitatives	
		Tècniques qualitatives	Entrevista en profundidad
		Altres	
	Població i mostra	220 mèdics y enfermeras	
Resultats rellevants	<p>Las enfermeras y médicos encuestados informaron como obstáculos para brindar atención a las mujeres víctimas de violencia, la falta de recursos humanos, el tiempo durante la práctica clínica habitual y la falta de redes sólidas de derivación.</p> <p>También indicaron que el enfoque y contenido enseñado eran aceptables y el conocimiento adquirido mediante la capacitación fue posible de implementar y había generado en los capacitados un cambio de perspectiva de ver la violencia contra las mujeres como un problema privado a entenderla como un problema de salud.</p> <p>La capacitación permitió a los profesionales de la salud reconocer las barreras que enfrentan las mujeres al revelar la violencia y su rol como apoyo en la captación.</p>		

Discussió plantejada	<p>En concordancia con lo descrito sobre la respuesta a la violencia de género, la formación de los proveedores por sí sola no es suficiente; los hallazgos de este trabajo lo confirman, ya que la creación de un espacio que asegure la privacidad y confidencialidad de las mujeres representó un factor fundamental a nivel del sistema que permitió responder a la violencia contra las mujeres.</p> <p>La evidencia de que la capacitación por sí sola no es suficiente, sino que debe estar relacionada a cambios en el sistema de salud se ha reflejado en la evidencia global, la cual se utilizó para reforzar las recomendaciones de las pautas clínicas y de políticas de la OMS que fueron la base de esta intervención y estudio.</p>		
Conclusions de l'estudi	<p>Los hallazgos se incorporan a la evidencia sobre las experiencias y percepciones de los profesionales de la salud sobre la capacitación en respuesta a la violencia contra las mujeres incluyendo la falta de recursos humanos, el tiempo que se designa a la atención en la práctica clínica habitual y la falta de redes de derivación sólidas.</p> <p>Estos datos demuestran la importancia de la capacitación de los proveedores de salud y también proporciona evidencia de formas de mejorar las respuestas de los sistemas de salud en los países de ingresos bajos y medianos.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4	X	Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
7					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Santos do Vale Hiugo, Rodrigues da Rocha Mariana, Nunes da Conceição Hayla. Nursing Care for Women in a Situation of Violence in Primary Health Care. Rev Cubana Enfermer [Internet]. 2022 [citado marzo 20 de 2023]; 38(1): e4067. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192022000100017&lng=en . Epub Apr 22, 2022				
Introducció	Resum de la introducció (màx.100 paraules)	La violencia de género infligida a las mujeres en Brasil, Panamá y Uruguay varió 14-17 % entre 1998 y 2017. Los servicios de Atención Primaria de Salud (APS) como puerta de ingreso al sistema, son responsables de lo concerniente a promoción, prevención, recepción, identificación y recuperación de mujeres en situación de violencia, es aquí donde la figura de la enfermera interviene en la atención directa a las víctimas, y la notificación de casos. Este estudio tiene por objetivo agregar evidencia científica, que demuestre posibles debilidades y fortalezas de enfermería en la atención de situaciones de violencia captadas en la APS.			
	Objectiu de l'estudi	Analizar la evidencia científica nacional e internacional sobre cuidados de enfermería a mujeres en situación de violencia en Atención Primaria de Salud.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica	x	Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	

		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	
Any de realització	2018				
Tècnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat				
	Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia				
	Escala (validada/no validada)				
	Registre de dades quantitatives		Búsqueda en base de datos		
	Tècniques qualitatives				
	Altres				
Població i mostra	Mujeres en situación de violencia				
Resultats rellevants	<p>La enfermera es de los primeros profesionales que entran en contacto con mujeres en situaciones de violencia, tiene la responsabilidad de identificar los casos, y orientarlos en búsqueda de soluciones en la red de atención a la violencia que involucra a varios otros sectores, como: asistencia social, educación, asistencia legal, etc.</p> <p>Los elementos y estrategias utilizados en la atención que permitirán un vínculo que genere confianza para poder hablar serán la empatía, saber escuchar y aceptar las decisiones de la otra persona.</p> <p>Las limitaciones señaladas fueron: falta de formación profesional, sentimiento de falta de preparación, el poco tiempo de la consulta debido a la sobrecarga laboral, dificultad en poder captar y hacer frente a la situación de violencia, por lo complicada que es la situación en sí.</p>				

<p>Conclusions de l'estudi</p>	<p>Las enfermeras tienen un rol fundamental en la identificación e intervención de los casos de violencia de género, debido a que conocen más de cerca la realidad de las usuarias, por lo que se destaca el potencial de las enfermeras que trabajan en APS.</p> <p>También será de suma importancia establecer un vínculo de confianza entre el profesional y la usuaria para que se genere un ámbito de seguridad y comodidad para poder hablar sobre el tema.</p> <p>La enfermera deberá estar preparada para recibir a la mujer y realizar una derivación oportuna a los servicios que integran la red asistencial.</p>		
<p>Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi</p>	<p>Likert 1</p>		<p>Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)</p>
	<p>Likert 2</p>		<p>Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica</p>
	<p>Likert 3</p>	<p>X</p>	<p>Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi</p>
	<p>Likert 4</p>		<p>Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric</p>

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
8					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Cordeiro AS, Silva ALA, Fernandes CTS, Nunes DC, Moraes-Filho IM. Importância do papel da enfermagem no atendimento à mulher vítima de violência e violência doméstica. REVISIA. [Internet] 2022[citado 7 de marzo de 2023] 11(3): 77-93. Disponible en: Doi: https://doi.org/10.36239/revisa.v11.n3.p77a93				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	Considerando el daño que la violencia ocasiona a la salud de la mujer, entra en juego la importancia de enfermería ya que juega un papel clave en el cuidado de estas mujeres, ya sea en el triaje hospitalario o en las distintas unidades de atención de salud, aplicando habilidades éticas jurídicas, con empatía y con una mirada holística y humanitaria en las acciones de cuidar. Para garantizar una asistencia de calidad a las mujeres que sufren violencia, es necesario el conocimiento y la formación de quienes los asisten, con la finalidad de lograr acciones resolutivas y eficaces.			
	Objectiu de l'estudi	Describir, frente a la literatura, las acciones de enfermería en el cuidado de mujeres víctimas de violencia doméstica, identificando falencias en las prácticas y dimensiones del cuidado.			
Metodologia	Tipus d'estudi		Revisió bibliogràfica	x	Assaig clínic
			Revisió sistemàtica		Casos control
			Metaanàlisi		Cohort

		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	
Any de realització	2021				
Tècnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat				
	Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia				
	Escala (validada/no validada)				
	Registre de dades quantitatives				
	Tècniques qualitatives		Base de datos		
	Altres				
Població i mostra					
Resultats rellevants	Tras la selección de documentos seleccionados 11 fueron considerados relevantes para el estudio, de los cuales se obtiene como resultado que la enfermera es la figura principal que recibe a las mujeres, tanto en atención primaria como en urgencias, y que debe brindar un diálogo amistoso, que logre generar un vínculo de confianza y seguridad con la víctima, promoviendo la intimidad para que se sientan cómodas y así poder lo sucedido para poder a priori tomar decisiones prioritarias.				
Discussió plantejada	La enfermería es la profesión corresponsable de las acciones de educación en salud, no sólo se trata de prestar servicios, sino de un vínculo que implica una relación basada en la humanización a través de la escucha cualificada y la organización de los servicios.				

	<p>Resulta evidente que la formación académica e incluso la experiencia profesional no preparan para enfrentar casos de violencia de género, por lo que es indispensable formación.</p> <p>Enfermería tiene la obligación de captar y registrar los casos ello generará más registros lo que obligará a las instituciones a invertir en acciones de vigilancia de la salud, orientado al cuidado y el bienestar de mujeres víctimas de violencia.</p>		
Conclusions de l'estudi	<p>La conducta de los profesionales de enfermería no sería posible sin un equipo multidisciplinario y sin la ayuda de la red de contención.</p> <p>La enfermera es el primer contacto con la víctima y debe propiciar un diálogo amistoso, que genere un vínculo de confianza y ser capaz de ofrecer refugio y asistencia a las víctimas.</p> <p>Es importante la formación y preparación, a través de educación continua y permanente y también la implementación de protocolos institucionales.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3	X	Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
9					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Freitas RJM de, Sousa VB de, Costa T da SC e, Feitosa RMM, Monteiro ARM, Moura NA de. Atuação dos enfermeiros na identificação e notificação dos casos de violência contra a mulher. hu rev [Internet] 2018 [citado marzo 28 de 2023];43(2):91-7. Disponible en: https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/2585				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	Los servicios de salud tienen un rol importante en la lucha contra la violencia, brindando muchas veces la primera atención a las víctimas, presentan, cobertura y atención a la mujer, pudiendo acoger, identificar y notificar el caso ante incidentes más graves. Esta investigación se planteó como objetivo comprender el papel de los enfermeros en la identificación y denuncia de casos de violencia contra la mujer en los servicios de emergencia de dos zonas de Brasil que registran un alto índice de violencia contra la mujer.			
	Objectiu de l'estudi	Comprender el papel de enfermería en la identificación y denuncia de casos de violencia contra las mujeres.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica		Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	x

	Any de realització	2014	
	Tècnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
		Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia	
		Escala (validada/no validada)	
		Registre de dades quantitatives	
		Tècniques qualitatives	Entrevista semi estructurada
		Altres	
	Població i mostra	10 enfermeros	
Resultats rellevants	<p>A menudo el proceso de identificación y denuncia de casos de violencia de género se ve obstaculizado por la falta de conocimientos de las enfermeras y el miedo a involucrarse con el caso.</p> <p>En varias ocasiones confunden el hecho de notificar con la denuncia y la criminalización, esto genera la invisibilidad del problema.</p> <p>Para trabajar de forma eficiente en la detección de casos de violencia de género en los servicios de salud es necesaria la capacitación, reflexión y apoyo a las enfermeras de forma que logren sentirse seguras.</p>		
Discussió plantejada	<p>Los enfermeros demostraron cierta inseguridad para identificar casos de violencia cuando las víctimas no lo dicen directamente y cuando es de tipo psicológica, ya que muchas veces no es entendida como violencia por la propia mujer, o por el profesional.</p> <p>Según Waiselfisz (2012), resalta la diferencia entre notificación y denuncia, la primera es un importante</p>		

	<p>instrumento de protección y no de denuncia y castigo. Sirve para registrar y sistematizar datos que posibilitan clarificar la información en post de definir prioridades en las políticas públicas de prevención de la violencia y promoción de la salud.</p> <p>Garbin (2015) resalta que solo notificando se podrá medir su dimensión epidemiológica</p>		
Conclusions de l'estudi	<p>Una de las limitaciones del estudio es que se realizó con una muestra reducida de participantes.</p> <p>Enfermería debería actuar de manera intersectorial promoviendo programas, proyectos y campañas con el objetivo no sólo de notificar la ocurrencia de la violencia, sino también apuntando a la prevención.</p> <p>Existe una discontinuidad entre la asistencia y la notificación ya que este es visto como un servicio burocrático, muchas veces asignado a otro profesional y no al enfermero.</p> <p>Prevalece la necesidad de la educación continua, sobre cómo deben ser remitidos los casos de violencia de género.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3	x	Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna				
10						
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Cortes LF, Padoin SM de M, Vieira LB, Landerdahl MC, Arboit J. Cuidar mulheres em situação de violência: empoderamento da enfermagem em busca de equidade de gênero. Rev Gaúcha Enferm [Internet]. 2015[citado mayo 1 de 2023] ;36 (sp):77–84. Disponible en: https://doi.org/10.1590/1983-1447.2015.esp.57162					
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	Las enfermeras representan un elemento clave para lograr los objetivos del milenio debido a su formación de trabajo en el concepto de salud y bienestar, así como el impacto psicosocial y factores socioeconómicos como la pobreza, etnia y el género, por lo que el empoderamiento de la mujer y la defensa de los derechos humanos son transversales al compromiso de esta profesión que en la vida diaria de los servicios de salud y los espacios sociales lucha por promover la reducción de las desigualdades que dificultan el acceso a la atención y a los servicios de salud de calidad.				
	Objectiu de l'estudi	Conocer las acciones de cuidado de las enfermeras en servicios de urgencia y emergencias y analizar las acciones que buscan el empoderamiento de las mujeres para la equidad de género.				
Metodologia	Tipus d'estudi		Revisió bibliogràfica		Assaig clínic	
			Revisió sistemàtica		Casos control	
			Metaanàlisi		Cohort	
			Estat actual del tema		Descriptiva	x
			Revisió històrica		Qualitativa	

	Any de realització	2013	
	Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
		Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia	
		Escala (validada/no validada)	
		Registre de dades quantitatives	
		Tècniques qualitatives	entrevista
		Altres	
	Població i mostra	10 enfermeros	
Resultats rellevants	<p>Los resultados demuestran que las acciones de atención a la salud llevadas a cabo por enfermería se basan en elementos clínicos y no clínicos.</p> <p>Los clínicos se refieren a los procedimientos y técnicas de enfermería; realizar la atención inicial de lesiones y traumatismos que son consecuencia de la violencia, y, los no clínicos incluyen el diálogo, escucha y orientación; referencias, o no, de mujeres y reuniones de equipo.</p>		
Discussió plantejada	<p>Es necesario buscar constantemente el desarrollo de competencias tanto en práctica clínica, y conocimientos a través de protocolos de atención y difusión de evidencia que contribuyan a los avances en derechos y autonomía de la mujer.</p> <p>La enfermera debe demostrar una actitud de interés, evitar juicios o victimización y empoderar a las mujeres para que salga de la situación de violencia mediante la posibilidad de ayuda a través de distintas</p>		

	<p>redes de apoyo</p> <p>En ocasiones las enfermeras también hablaban con las mujeres y acompañantes dándoles a conocer sus derechos y la posibilidad de estar libre de la pareja abusiva.</p>		
Conclusions de l'estudi	<p>Es necesario expandir el enfoque de la atención a las mujeres en sus necesidades y a la continuidad del cuidado, es decir, más allá de su cuerpo físico incluyendo los determinantes de la salud que construyen su vida, sus relaciones sociales, la renta, vivienda, dirigiéndose a la articulación con otros servicios, en un intento de que las mujeres minimicen el daño de la violencia vivida.</p> <p>El desafío es romper con la fragmentación del cuidado y reflexionar sobre la posibilidad de enfrentar la violencia y las desigualdades de género.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4	x	Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
11					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Medina-Maldonado Venus Elizabeth, Landenberger Margarete, Rondón de Gómez Rosa, Osio Patrizzi Miguel. Experiencias de enfermeras en prevención de la violencia de género y asistencia a mujeres afectadas. Rev Cubana Enfermer [Internet]. 2015 Dic [citado marzo 29 de 2023]; 31(4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192015000400006&lng=es .				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	La violencia de género representa un grave problema de salud pública que indefectiblemente impacta de forma negativa en la salud de las mujeres. Por lo cual es sumamente necesario que participen y se involucren todos los integrantes del equipo de salud en lo que incluye la prevención, detección, derivación, y seguimiento de los casos. La consecuencia de la ineficiencia en la detección de casos repercutirá en las mujeres que no tendrán la debida asistencia.			
	Objectiu de l'estudi	Explorar las experiencias del personal de enfermería que labora en centros de atención primaria con relación al rol de la profesión en la prevención y asistencia de la violencia de género.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica		Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	x

	Any de realització	2010	
	Tècnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
		Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia	
		Escala (validada/no validada)	
		Registre de dades quantitatives	
		Tècniques qualitatives	Entrevista semiestructurada
		Altres	
	Població i mostra	12 enfermeras	
Resultats rellevants	<p>En la mayoría de las enfermeras entrevistadas se detectó desconocimiento para asumir la prevención y asistencia del problema de violencia.</p> <p>Se evidenció que fueron las propias pacientes quienes contaron encontrarse en una situación de violencia por parte de su pareja, esto podría sugerir una falta de diagnóstico anticipado y la exclusión de recibir tratamiento oportuno, debido a que no es de rutina el interrogatorio a las mujeres como parte de sus antecedentes personales.</p> <p>Por otra parte, se evidenció en n=1/7 de las entrevistas, que se sigue una línea de acción consecutiva en el abordaje de violencia en niñas y adolescentes.</p>		
Discussió plantejada	<p>Surge de las entrevistas la falta de educación formal desde la óptica de violencia vinculada al género.</p> <p>Algunos estudios soslayan que el personal de enfermería proporciona una asistencia efectiva a las</p>		

	mujeres que padecen violencia, aunque los datos recabados en las diferentes investigaciones no son suficientes.		
Conclusions de l'estudi	<p>Resulta necesario implementar programas de formación para el personal de enfermería que le permita la adquisición de herramientas para ofrecer una adecuada orientación y subsecuente derivación a los servicios interdisciplinares.</p> <p>Resulta importante rever los programas de estudios donde se determine la importancia que tiene la temática para la formación de la carrera de enfermería, y la repercusión posterior en el ejercicio de la profesión, las participantes de este estudio expresaron que no tuvieron formación específica durante su formación.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4	x	Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
12					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Kalra, N., Hooker, L., Reisenhofer, S., Di Tanna, G. L., & García-Moreno, C. (2021). Training healthcare providers to respond to intimate partner violence against women. Cochrane Database of Systematic Reviews, [Internet]. 2021[citado marzo 29 de 2023]; Disponible en: doi:10.1002/14651858.cd012423.pub2				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	Esta revisión refleja la situación actual de la violencia de género como una cuestión puramente al género que con mayor frecuencia es perpetrada por hombres a mujeres. Las mujeres que padecen violencia de género en ocasiones acuden a profesionales sanitarios (enfermeras, médicos, matronas), pero no para decir lo que les sucede por lo que la formación de los profesionales en dicha materia constituye una intervención meramente importante para captar esta situación y brindar a las mujeres una atención de calidad.			
	Objectiu de l'estudi	Evaluar la efectividad de los programas de formación que pretenden mejorar la identificación y la respuesta de los profesionales sanitarios ante la violencia contra la mujer infligida por la pareja, en comparación con ninguna intervención, lista de espera, placebo o formación habitual.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica	x	Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	
	Any de	2020			

	realització		
	Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
		Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia	
		Escala (validada/no validada)	
		Registre de dades quantitatives	Base de datos, ensayos aleatorizados
		Tècniques qualitatives	
		Altres	
	Població i mostra	1662 participants, 618 mèdics/estudiants, 460 enfermeras/estudiants, 348 dentistas/estudiants, 161 consejeros o psicólogos/estudiants, 70 matronas y 5 trabajadores sociales.	
Resultats rellevants	<p>Los resultados fueron considerados de certeza baja a muy baja</p> <p>Un estudio (con 54 participantes) demostró que la identificación de la violencia de género podría mejorar 6 meses después de la formación, en contraposición tres estudios que contaron con la participación de 48 participantes, revelaron que la formación tuvo un efecto pequeño o ninguno en la identificación, y la documentación de la violencia o ambas. En la comparación de formación en violencia de género con la formación habitual, no se vieron efectos concluyentes en las actitudes de los profesionales ni en la derivación a los distintos servicios. Ningún estudio de los analizados evaluó en relación a la formación a los profesionales si existe impacto sobre la salud mental de las mujeres víctimas de violencia de género.</p>		

<p>Conclusions de l'estudi</p>	<p>La evidencia de que la formación conseguiría una mejora en referencia a las actitudes de los profesionales de la salud es débil en general.</p> <p>No hay seguridad de que la formación podría mejorar el conocimiento y preparación de los profesionales en relación a la violencia de género.</p> <p>La confianza de los hallazgos es débil por la diferencia entre los estudios y el riesgo incierto de sesgo, tampoco se ha determinado el efecto mantenido de la formación en un período superior a 12 meses.</p> <p>Se concluye que es necesario realizar más investigaciones que superen que evalúen los efectos de la formación.</p>		
<p>Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi</p>	<p>Likert 1</p>		<p>Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)</p>
	<p>Likert 2</p>		<p>Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica</p>
	<p>Likert 3</p>		<p>Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi</p>
	<p>Likert 4</p>	<p>X</p>	<p>Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric</p>

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
13					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Leskošek V, Lučovnik M, Pavše L, Sršen TP, Krajnc M, Verdenik I, Velikonja VG. The Role of Health Services in Encouraging Disclosure of Violence Against Women. Zdr Varst. [Internet] 2017 [citado abril 9 de 2023] 9;56(4):220-226. Disponible en: doi: 10.1515/sjph-2017-0030. PMID: 29062396; PMCID: PMC5639811.				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	La violencia de género es un importante problema de salud pública debido a los altos gastos de tratamiento de lesiones causadas En Eslovenia existe una creciente conciencia del problema, aunque aún no ha sido suficientemente debidamente considerado como tema importante en la salud pública. Este artículo se centra en los datos sobre la divulgación de violencia y el rol de los trabajadores de la salud en el proceso de divulgación, mediante un cuestionario anónimo para la identificación de mujeres víctimas de violencia a todas las puérperas en una unidad de maternidad durante un período de tres meses en 2014.			
	Objectiu de l'estudi	Evaluar las diferencias en la revelación por tipo de violencia para mejorar planificar el papel de los servicios de salud en la identificación y denuncia de la violencia.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica		Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	x

	Any de realització	2014	
	Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
		Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia	
		Escala (validada/no validada)	
		Registre de dades quantitatives	
		Tècniques qualitatives	Cuestionario
		Altres	
	Població i mostra	1272 puerperas	
Resultats rellevants	<p>Se obtuvieron 574 artículos de los que se utilizaron 13 para elaborar este estudio.</p> <p>De los artículos analizados se obtuvo como resultado que aproximadamente un tercio de las encuestadas reportaron los casos de violencia, pero no todos los tipos de violencia se reportaron en igual proporción. Algunas mujeres que sufrieron violencia no pidieron ayuda: una décima parte de las que sufrieron violencia física, una quinta parte de los que sufrieron abusos psicológicos, y un tercio de las que fueron abusadas sexualmente.</p> <p>El porcentaje de violencia de género denunciada al personal de salud es bajo (9,3% a 20,8%)</p>		
Discussió plantejada	<p>Se necesita mucho tiempo y número de visitas para que las mujeres pueden hablar y expresar sus problemas, la actitud de los trabajadores de la salud debe ser respetuosa para que las mujeres se animen a revelar la violencia, el profesional de la salud debe estar en conocimiento de que las mujeres no hablarán</p>		

	a menos que crean que es seguro hacerlo.		
Conclusions de l'estudi	<p>Las instituciones de salud deben trabajar en sensibilizar a los proveedores de atención y alentar la detección rutinaria de la violencia intima de pareja, así como elaborar protocolos para un manejo adecuado.</p> <p>Para maximizar la eficiencia al identificar a las víctimas de la violencia, los trabajadores de la salud deben alentar a las mujeres a hablar sobre la violencia potencial e incorporarlo a su rutina diaria.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4	x	Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
14					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Baidés Noriega R. Role of Nursing in Secondary Prevention from Primary Care. Enfermería Global [Internet]. 2018 [citado abril 25 de 2023];17(3):497–508. Disponible en: https://0-search-ebSCOhost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=a9h&AN=131347816&lang=es&site=ehost-live				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	<p>La violencia es un fenómeno complejo tratándose de un problema de salud pública en el que la Enfermería realiza un importante papel de prevención secundaria.</p> <p>La prevención secundaria consiste en detectar de forma precoz el problema y de forma de prevenir complicaciones asociadas y realizar intervenciones con la finalidad de impedir o retrasar el desarrollo de la enfermedad.</p> <p>La prevención secundaria es una tarea fundamental dentro de los equipos de atención primaria.</p> <p>Los Centros de Salud constituyen el lugar propicio para dicha tarea, ya que se considera que hay mayor posibilidad de que las mujeres que sufren violencia de género acuden ahí.</p>			
	Objectiu de l'estudi	Conocer procedimientos para la detección e intervención precoz de la violencia de género desde Enfermería de Atención Primaria			
Metodologia	Tipus d'estudi		Revisió bibliogràfica	x	Assaig clínic

		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	
	Any de realització	2018			
	Tècnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat			
		Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia			
		Escala (validada/no validada)			
		Registre de dades quantitatives			
		Tècniques qualitatives	Base de datos		
		Altres			
Resultats rellevants	<p>La prevención secundaria de la violencia en la mujer resulta una misión imprescindible desde los equipos de atención primaria.</p> <p>Los indicadores de violencia de género presentes en la literatura son varios y diversos, y de su detección depende plenamente de cuan posible sea intervenir.</p> <p>Se aprecia que la identificación de casos se basa en la relación de confianza y seguridad brindada por el profesional que asiste a la mujer y en técnicas como la entrevista o el uso de cuestionarios, ante su confirmación los procedimientos establecidos están regulados por diferentes normas legales y</p>				

	deontológicas que los profesionales tienen el deber de conocer
Discussió plantejada	<p>Los profesionales sanitarios son claves en la detección y abordaje precoz de los casos es sin duda la enfermera primordial para ello.</p> <p>La información revisada reveló que se debe mantener una postura activa ante indicadores de sospecha de violencia en una mujer, siempre y cuando los profesionales sanitarios conozcan los indicadores de violencia. Sin embargo, la mayoría no están formados sobre el tema.</p> <p>Las instituciones deberán facilitar protocolos y formación completa y consensuada con el resto de organismos y servicios ya que, tras la revisión de diferentes protocolos sanitarios españoles, se considera insuficiente la información encontrada respecto a algunos aspectos.</p>
Conclusions de l'estudi	<p>La violencia de género es un grave problema que tiene repercusión en la salud de las mujeres que la sufren.</p> <p>Tiene un papel fundamental Enfermería de Atención Primaria debido a que tiene mayor accesibilidad y contacto frecuente con la mujer durante las diferentes etapas de su vida, por lo que puede detectar precozmente si esta padece situaciones de violencia</p> <p>Es necesario mejorar la formación y conocimientos entre los profesionales sanitarios y de esta manera potenciar la prevención secundaria</p>

Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3	x	Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
15					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Tracz R, Gonçalves AF, de Vargas Marcovicz G. Atuação Do (A) Enfermeiro (A) À Mulheres Vítimas De Violências. Revista Científica de Enfermagem - RECIEN [Internet]. 2022 Sep [citado marzo 20 de 2023];12(39):3–12. Disponible en: https://0-search-ebsohost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=a9h&AN=160771098&lang=es&site=ehost-live				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	<p>La Atención Primaria realiza acciones de promoción, prevención, protección y rehabilitación y se articula con acciones que garantizan los principios de universalidad, integralidad y equidad, constituyendo la primera puerta de entrada a la red y el primer contacto con el usuario</p> <p>Las enfermeras y profesionales de la salud que se desempeñan en la APS precisan abarcar las diferentes esferas que involucran el acto de violencia, por lo que es fundamental una comunicación intersectorial y multidisciplinaria.</p> <p>Una adecuada atención también significa contar con recursos adecuados para el cuidado y la notificación de casos</p>			
	Objectiu de l'estudi	Analizar el comportamiento de enfermeras en Unidades Básicas de Salud en relación a casos de violencia contra la mujer en la ciudad de Ponta Grossa-Paraná.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica		Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	

		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	x
Any de realització	2021				
Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat				
	Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia				
	Escala (validada/no validada)				
	Registre de dades quantitatives				
	Tècniques qualitatives	entrevista			
	Altres				
Població i mostra	6 enfermeras				
Resultats rellevants	<p>El estudio reveló que el rol de la enfermera lleva en sí acciones de escucha activa, promoción y prevención, fomentar el empoderamiento, notificación y trabajo en red con otros servicios.</p> <p>Las enfermeras relataron que los tipos de violencia que más se perciben en las mujeres que buscan atención en la Unidad Básica de Salud, actúan, son: violencia psicológica con 56%, violencia física con 33% y violencia sexual con 11% de los casos denunciados durante la recolección de datos.</p> <p>Las enfermeras que trabajan en la Atención Primaria de Salud necesitan poder cuidar estas mujeres victimizadas. Sin embargo, es posible que este servicio no sea rutinario, por lo que las enfermeras tienden a tener sentimientos diferentes a los habituales en su rutina de trabajo. Los sentimientos que</p>				

	manifestaron sentir cada vez que necesitan acoger a una mujer víctima de violencia fueron la tristeza, seguido del estrés, la frustración, la impotencia y la angustia.		
Discussió plantejada	Estar en conocimiento del perfil de las mujeres víctimas de violencia de género engloba el proceso de territorialización, que permite planificar y promover mejoras en los flujos y protocolos de atención. Mientras exista falta de un protocolo específico para la recogida de datos, se seguirán teniendo dificultades en la acogida y posibles formas de dar frente a la situación.		
Conclusions de l'estudi	Es necesario para un buen funcionamiento que se realicen mejoras a nivel de las políticas públicas relacionadas con la salud de la mujer, así como también contar con enfermeras calificadas y con lineamientos claros para la Atención Primaria enfocados en este tema.		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2	x	Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
16					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Melo EA, de Alcântara PPT, de Oliveira CAN, de Almeida RC, de de Freitas MA, Soares LG. Mulheres Em Situação De Violência: Reflexões Sobre a Atuação Da Enfermagem. Enfermagem Atual in Derme [Internet]. 2022 [citado mayo 1 de 2023]; 96(40):1–8. Disponible en: https://0-search-ebsohost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=162478514&lang=es&site=ehost-live				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	<p>La violencia de género constituye una de las principales formas de violación de los derechos humanos.</p> <p>La mayoría de las mujeres en situación de violencia padecen de estrés postraumático, ansiedad y depresión con alta tasa de suicidio o en casos graves la muerte por parte del cónyuge.</p> <p>El profesional de la salud debe ser capaz de actuar contribuyendo a reducir el ciclo de la violencia, prevenir casos, y conocer los servicios de redes de apoyo.</p> <p>Sin embargo, la violencia de género es pocas veces identificada generándose un subregistro, lo que lleva a enmascarar la gravedad de la situación.</p>			
	Objectiu de l'estudi	Discutir, a partir del análisis reflexivo, el papel de los profesionales de enfermería en la asistencia a las mujeres en situación de violencia doméstica.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica	x	Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	

		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	
Any de realització	2022				
Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat				
	Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia				
	Escala (validada/no validada)				
	Registre de dades quantitatives				
	Tècniques qualitatives				
	Altres		Artículo reflexivo		
Població i mostra					
Resultats rellevants	<p>Los resultados demuestran que las enfermeras tienen un rol importante en la atención de la violencia de género, por ser de los primeros profesionales en contactarse con las mujeres en los servicios de salud.</p> <p>Las acciones que realiza enfermería son muchas entre ellas: la escucha activa, captación, seguimiento y prevención de los perjuicios que ha causado la agresión, además de intentar lograr la reinserción social, garantizando el equilibrio biopsicosocial.</p>				
Discussió plantejada	<p>La literatura hace reflexionar acerca de lo más relevantes e indispensables que debe realizar enfermería durante la asistencia como: no juzgar, escuchar, evitar juicios de valor y no reforzar estereotipos de culpa y victimización, también garantizar el secreto, dando a entender que la consulta es un espacio seguro y</p>				

	los registros son confidenciales.		
Conclusions de l'estudi	El estudio concluye en que deben realizarse más investigaciones para obtener mejor comprensión de la práctica enfermería en la asistencia a mujeres en situaciones de violencia de género.		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3	x	Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna
17		
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Vieira de Lima JC, Clemente dos Santos R, Chaves da Silva J, de Sousa Costa da Silva R, Ramos Medeiros Souto CM, Queiroga Souto R, et al. Tracking and Referral by Nurses in the Family Health Strategy of Violence Cases against Women. Cogitare Enfermagem [Internet]. 2020 [citado abril 7 de 2023]; 25:183–93. Disponible en: https://0-search-ebSCOhost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=142739719&lang=es&site=ehost-live	
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	Los profesionales de la salud en situaciones de violencia física deben realizar procedimientos como: la recogida de huellas, la acogida de la víctima, la cumplimentación del formulario de notificación preceptiva y remitir el informe a las autoridades policiales antes de que desaparezcan los rastros. Es de suma importancia que tenga la capacidad de realizar esta actuación sin olvidar la humanización y el respeto a la voluntad de la víctima y apoyarla en su decisión Con este fin, este estudio tuvo como objetivo comprender cómo es el seguimiento y la derivación de casos de violencia por enfermeras de Paraíba.
	Objectiu de l'estudi	Comprender cómo se realiza el rastreo y la derivación de casos de violencia contra la mujer por parte de enfermeras en el marco de la Estrategia de Salud de la Familia del interior del Estado de Paraíba

Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica		Assaig clínic		
		Revisió sistemàtica		Casos control		
		Metaanàlisi		Cohort		
		Estat actual del tema		Descriptiva		
		Revisió històrica		Qualitativa	x	
	Any de realització	2018				
	Tècnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat				
		Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia				
		Escala (validada/no validada)				
		Registre de dades quantitatives				
Tècniques qualitatives		entrevista				
Altres						
Població i mostra	7 enfermeras					
Resultats rellevants	<p>El estudio reveló que las enfermeras saben reconocen conceptos importantes sobre el tema de la violencia, pero no así la remisión y seguimiento de los casos.</p> <p>Se demuestra que no hay un seguimiento del fenómeno porque tercerizan la asignación para el servicio social.</p> <p>Se observó que algunos profesionales desconocen la mayoría de las referencias a otros servicios o los</p>					

	<p>conocen en forma fragmentada</p> <p>Se denota una clara necesidad de la calificación del equipo de enfermería en cuanto al adecuado seguimiento y derivación de casos.</p>		
Discussió plantejada	<p>La falta de derivación de mujeres víctimas de violencia no solo es explícita entre las enfermeras profesionales, también ocurre con otros profesionales.</p> <p>Algunas investigaciones señalan que los profesionales asumen que la derivación sólo debe ser a la comisaría de la mujer</p>		
Conclusions de l'estudi	<p>Las enfermeras entienden la violencia y que la consulta ginecológica es un buen lugar para identificar los casos.</p> <p>La investigación aclara los distintos puntos de debilidad de los servicios de salud lo que conduce a que se presenten dificultades en la lucha contra el fenómeno de la violencia de género y demuestran la necesidad de contar con personal cualificado.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2	x	Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)	Codi de referència interna	
18		
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Silva Alexandre AC, Leite Salgueiro CDB, Gomes Gonçalves CF, Cordeiro Lopes J, da Silva Rodrigues JV, Correia Santos JL, et al. Violência de gênero sob a ótica e cuidado do enfermeiro: assistência à mulher vitimada. Enfermagem Brasil [Internet]. 2019 [citado abril 7 de 2023];18(1):141–8. Disponible en: https://0-search-ebsohost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=135533574&lang=es&site=ehost-live	
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	La atención de enfermería a las víctimas de violencia de género debe ser planificada para promover la seguridad, aceptación, respeto. Para llevarlo a cabo son necesarias políticas públicas de salud. Esta investigación presenta un abordaje metodológico amplio y permite reunir estudios experimentales y no experimentales para la comprensión del objeto de estudio Se analizan artículos publicados del 2014 hasta 2017, que discutan el comportamiento de los enfermeros frente a los casos de violencia de género totalizando 7 estudios para componer los resultados de este artículo.
	Objectiu de l'estudi	Analizar estudios publicados entre 2014 y 2017 acerca de la actuación del enfermero ante la violencia contra la mujer.

Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica	x	Assaig clínic		
		Revisió sistemàtica		Casos control		
		Metaanàlisi		Cohort		
		Estat actual del tema		Descriptiva		
		Revisió històrica		Qualitativa		
	Any de realització	2019				
	Tècnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat				
		Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia				
		Escala (validada/no validada)				
		Registre de dades quantitatives				
Tècniques qualitatives				Base de dades		
Altres						
Població i mostra						
Resultats rellevants	<p>Mediante la lectura de los estudios analizados, se formaron las siguientes categorías temáticas: el enfrentamiento de la enfermería frente a la violencia, el estudio de la violencia y la red de apoyo a la mujer víctima.</p> <p>La mayoría de los profesionales involucrados en los estudios analizados catalogan la violencia como un problema social, jurídico, cultural y de salud pública</p>					

Discussió plantejada	Todos los estudios analizados se encuentran dentro del nivel de evidencia relativamente bajo por lo que se considera la necesidad de estudios con niveles superiores para la producción de conocimiento en las investigaciones sobre el tema.		
Conclusions de l'estudi	De los datos obtenidos, se observó que el abordaje y la atención de las mujeres víctimas de la violencia de género resultante de los enfermeros, aún se encuentra debilitado, notándose que la asistencia carece de una mayor articulación de la red de apoyo, y formación continua de enfermería sobre la temática y la legislación que reglamenta la notificación de los casos sospechosos.		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2	x	Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	iLikert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
19					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Ferreira Acosta D, de Oliveira Gomes VL, de Oliveira DC, Corrêa Marques S, da Fonseca AD. Social representations of nurses concerning domestic violence against women: study with a structural approach. Revista Gaucha de Enfermagem [Internet]. 2018 [citado abril 7 de 2023];39(1):1–20. Disponible en: https://0-search-ebSCOhost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=130881524&lang=es&site=ehost-live				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	<p>Las situaciones de violencia construyen sus bases en cuestiones de género en relaciones de poder, fuerza y dominación que culminan en diversas formas de violencia contra la mujer, esto se expresa en normas y conductas esperadas de hombres y mujeres, fomentando que ciertas conductas violentas sean naturalizadas. Las enfermeras son aliadas en la detección de casos de violencia de género y lo deben percibir como un grave fenómeno social y de salud pública, dejar de lado sus creencias, etiquetas y prejuicios para asegurar un desempeño profesional más efectivo.</p> <p>El reconocimiento de ello expone el problema en el ámbito de atención hospitalaria.</p>			
	Objectiu de l'estudi	Analizar la estructura y el contenido de las representaciones sociales de los enfermeros sobre la violencia doméstica contra las mujeres.			
Metodologia	Tipus d'estudi		Revisió bibliogràfica		Assaig clínic
			Revisió sistemàtica		Casos control
			Metaanàlisi		Cohort

		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	x
Any de realització	2014				
Técnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat				
	Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia				
	Escala (validada/no validada)				
	Registre de dades quantitatives				
	Tècniques qualitatives		Entrevista semi estructurada		
	Altres				
Població i mostra	100 enfermeras entre 20 y 59 años				
Resultats rellevants	<p>Las enfermeras encuestadas reconocen que la violencia afecta no solo a la mujer sino también a sus hijos y demás familiares. También mencionan la importancia de una red de atención primaria compuesto por familiares, amigos y vecinos.</p> <p>Las principales razones por las que las mujeres permanecen en una posición de sumisión y violencia son la falta de apoyo familiar y la falta de conocimiento de los servicios de salud</p> <p>El término inductor fue “violencia doméstica contra la mujer”, la distribución de los términos varió. Se observa una representación negativa en alusión a las formas de violencia y su juicio, como "agresión física" y "falta de respeto". En la primera periferia, "miedo", revela tanto la sensación de profesionales</p>				

	como las víctimas contra el agresor, y "sumisión" se califica como una causa de la violencia.		
Discussió plantejada	<p>Las enfermeras juzgan las acciones de los agresores, pero reconocen la influencia del entorno social como disparador de la violencia.</p> <p>Aprendiendo sobre los orígenes de la violencia se puede apoyar el replanteamiento de intervenciones para mujeres victimizadas, sus familias, y del agresor abordando las cuestiones de las relaciones de igualdad y la socialización de hombres y mujeres.</p>		
Conclusions de l'estudi	<p>El miedo debe ser confrontado tanto por las víctimas como por las enfermeras en su trabajo diario.</p> <p>Los resultados revelan la importancia de capacitar a los trabajadores de la salud para evitar el miedo por lo desconocido y a ser criticado por los compañeros.</p> <p>Estudios como éste concluyen la necesidad de investigar este fenómeno y plantean interrogantes sobre la dinámica organizativa de los servicios de salud y la responsabilidad de los gestores de proporcionar y fomentar la formación a los profesionales de enfermería.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3		Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4	x	Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
20					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Pérez García C. La pràctica clínica enfermera en el abordaje de la violencia de género. Cul. Cuid. [Internet]. 13 de enero de 2015 [citado 7 de marzo de 2023];(40):107-15. Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/43947				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	La violencia de género es un fenómeno que azota al mundo entero no distingue de clases sociales ni ámbitos de la sociedad. Las necesidades específicas de las mujeres que padecen violencia de género son multidimensionales, y requieren intervenciones sanitarias que abarquen distintos aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Por lo que se hace necesaria la implicancia de todo el personal de los servicios de salud desde una perspectiva de atención integral			
	Objectiu de l'estudi	Conocer la base de actuación enfermera para el abordaje de la violencia de género.			
Metodologia	Tipus d'estudi	Revisió bibliogràfica	x	Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	
		Estat actual del tema		Descriptiva	
		Revisió històrica		Qualitativa	

Any de realització	2014	
Tècnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat	
	Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia	
	Escala (validada/no validada)	
	Registre de dades quantitatives	
	Tècniques qualitatives	Base de datos
	Altres	
Població i mostra		
Resultats rellevants	<p>El Consejo General de Enfermería español destaca la existencia de dos campos en el abordaje de la Violencia de Género: el educativo y el sanitario, sobre todo en el ámbito de la prevención, detección y rehabilitación de este problema (Consejo General de Enfermería 2013).</p> <p>La formación de enfermería debería incluir el aprendizaje de la entrevista psicosocial y, la adquisición de habilidades, como la acogida, la escucha y la contención.</p> <p>A nivel sanitario se están desarrollando programas formativos encaminados a potenciar las habilidades de las enfermeras en detectar, informar y evaluar los malos tratos.</p>	
Discussió plantejada		
Conclusions de l'estudi	Evidentemente la violencia es un grave problema de salud pública	

	<p>Abordarlo requerirá un punto de vista integral e integrado y de un trabajo interdisciplinar.</p> <p>Los centros de salud, de planificación familiar, salud mental y urgencias deben participar en la prevención, detección precoz y la atención de la mujer.</p> <p>Para abarcar de forma integral todos los aspectos que atañen a la mujer víctima de violencia es necesario contar con formación, realizar una correcta gestión de los recursos con lo que se cuenta y coordinar con los referentes educativos, sociales contar con los servicios jurídicos y policiales para dar batalla a la violencia.</p>		
<p>Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi</p>	Likert 1		<p>Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)</p>
	Likert 2	x	<p>Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica</p>
	Likert 3		<p>Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi</p>
	Likert 4		<p>Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric</p>

Núm. de fitxa (per orde)		Codi de referència interna			
21					
Cita bibliogràfica (Segons Vancouver)	Corazza A, Alberti A, Destrebecq A. Ruolo dell’Infermiere all’interno dei Centri Antiviolenza di Regione Lombardia. Italian Journal of Nursing (IJN) [Internet]. 2020 [citado marzo 20 de 2023];(33):36–42. Disponible en: https://0-search-ebSCOhost-com.llull.uib.es/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=ccm&AN=146564095&lang=es&site=ehost-live				
Introducció	Resum de la introducció (màx. 100 paraules)	En los últimos años el tema de la violencia de género ha estado en boga cobrando cada vez más importancia, en el conocimiento del fenómeno, esto ha facilitado el reconocimiento de los Centros Antiviolenza (CAV), en los diferentes territorios regionales en Italia, estos centros tienen como finalidad la seguridad de las víctimas de la violencia, permitiendo la recuperación de la autonomía y el sentido de confianza y autoestima.			
	Objectiu de l’estudi	investigar el papel de la enfermera en el cuidado de las víctimas de violencia de género, desde la fase de acceso a urgencias hasta la continuidad de los cuidados tras el alta, subrayando la necesidad de introducir la figura de enfermería en el equipo de los Centros Antiviolenza de la Región de Lombardía.			
Metodologia	Tipus d’estudi	Revisió bibliogràfica		Assaig clínic	
		Revisió sistemàtica		Casos control	
		Metaanàlisi		Cohort	

		Estat actual del tema		Descriptiva	x
		Revisió històrica		Qualitativa	
Any de realització	2019				
Tècnica recollida de dades	Enquesta/qüestionari validat		cuestionario		
	Enquesta/qüestionari d'elaboració pròpia				
	Escala (validada/no validada)				
	Registre de dades quantitatives				
	Tècniques qualitatives				
	Altres				
Població i mostra	Trabajadores de 16 centros anti violència. Italia				
Resultats rellevants	<p>Los datos recabados del análisis de los cuestionarios dan como resultado que la mayoría de los Centros Antiviolenencia de la Región de Lombardía no hacen uso de la figura de enfermería ni tienen en cuenta su implementación en el futuro.</p> <p>Las razones más mencionadas es que no se evidencia la necesidad de prestar cuidados de enfermería dentro de la CAV ya que en caso de ser necesario derivan a las mujeres al Servicio de Urgencias más cercano, lo que tiene como consecuencia una hospitalización para la mujer víctima de violencia</p>				

Conclusions de l'estudi	<p>Contar con la presencia de la Enfermera dentro del equipo de los Centros Antiviolenencia, ofrece un continuo en la atención a la mujer que acude tras el alta hospitalaria al centro y permite en su caso, no necesariamente acudir al Servicio de Urgencias, la Enfermera garantizaría la posibilidad de mantener el control de los seguimientos de salud, incluso terapias a largo plazo.</p>		
Valoració (escala Likert) Valorar l'article segons la seva rellevància per respondre la pregunta de la investigació proposada a l'estudi	Likert 1		Poc rellevant per l'objecte del nostre estudi (valorar-ne l'exclusió)
	Likert 2		Rellevant pel marc teòric de justificació de l'estudi, però de poca qualitat metodològica
	Likert 3	x	Rellevant per la metodologia d'investigació, però amb resultats poc interessants per al vostre estudi
	Likert 4		Rellevant per la metodologia, resultats, conclusions i marc teòric